

Iloprost (Ilomedine ®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn iloprost gaat gebruiken. Voor deze behandeling verblijft u telkens ruim een dagdeel op de afdeling Dagbehandeling, locatie Dordwijk.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van iloprost

Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen zoals bij het fenomeen van Raynaud en vasculitis.

Het is een vaatverwijdend medicijn. Dit medicijn maakt het bloed ook minder stroperig. Hierdoor verbetert de bloeddorstrooming. Dit kan ervoor zorgen dat wondjes bijvoorbeeld aan de vingers sneller genezen.

Het effect van de behandeling kan snel optreden en kan enkele weken (soms maanden) aanhouden.

Het gebruik van iloprost

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Infuus

Iloprost wordt via een infuus gegeven. U krijgt meestal 3 - 5 dagen achter elkaar ieder dag een infuus. Ieder infuus duurt ongeveer 6 uur. De reumatoloog bespreekt met u of u na elk infuus naar huis kunt gaan of gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis opgenomen blijft.

De voorgeschreven dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en wordt gegeven volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid waarmee het infuus inloopt langzaam wordt opgehoogd.

Bijwerkingen

U kunt tijdens het infuus last krijgen van bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Hoofdpijn
- Maagdarmklachten zoals misselijkheid en braken
- Het warm krijgen en transpireren
- Bloeddrukverandering
- Pijn in de kaak
- Pijn in het aangedane lichaamsdeel

Controle

Tijdens het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en hartslag. De toedieningssnelheid van het infuus is afhankelijk van deze controles en van hoe u zich voelt (of u bijvoorbeeld last van hoofdpijn of misselijkheid heeft).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Iloprost heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid. Iloprost mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Tijdens de behandeling wordt het geven van borstvoeding ontraden.

Vaccinaties

Dit medicijn heeft geen invloed op de griepvaccinatie (grieprik) en alle andere vaccinaties.

Gebruik van iloprost samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met iloprost.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Alcohol

Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom raden we het gebruik van alcohol op de dagen dat u het infuus krijgt, af.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0903