

Infliximab

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

**Albert
Schweitzer**
ziekenhuis



Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn infliximab gaat gebruiken. Voor deze behandeling verblijft u ongeveer een dagdeel op de afdeling Dagbehandeling, locatie Zwijndrecht.

In de folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor uw afspraak heeft gelezen. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Werking van infliximab

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten, één daarvan is TNF. Dit lichaamseigen eiwit activeert de afweercellen in het lichaam waardoor er een ontstekingsreactie in de gewrichten op gang komt. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er teveel TNF.

Het medicijn infliximab blokkeert de werking van TNF. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten. Infliximab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wie krijgen er infliximab?

Infliximab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met infliximab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat we onder andere onderzoeken of u in het verleden een tbc-infectie of hepatitis heeft gehad.

Een paar dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen bij de afdeling Bloedafname van het ziekenhuis. Via dit bloedonderzoek kunnen vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opgespoord worden. U krijgt de uitslagen van het bloedonderzoek bij uw reumatoloog of van de reumaverpleegkundige.

Als u een afspraak voor het infuus heeft en u weet of vermoedt dat u een infectie heeft, bel dan zo spoedig mogelijk naar de reumaverpleegkundige. Zie ook het kopje 'Infliximab infuus' verder op in de folder. Meestal wordt het infuus dan even uitgesteld.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het gebruik van infliximab

Infliximab wordt via een infuus gegeven. Dit gebeurt in het ziekenhuis. De dosering infliximab is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en van de mate van ontstekingen.

Infliximab kan snel werken, soms al na 48 uur. Vaak zijn enkele weken nodig om voldoende resultaat te bereiken. Als blijkt dat u goed op het medicijn reageert, wordt de dosering soms verlaagd. De behandeling met infliximab wordt meestal gecombineerd met het medicijn methotrexaat (MTX) dat u al gebruikt.

Infliximab infuus

De eerste drie keren dat u de infliximab krijgt, worden volgens een vast schema gegeven: week 0 – 2 – 6. Daarna wordt de infliximab gemiddeld iedere zes of acht weken gegeven.

Bij bepaalde lichamelijke klachten mag u *geen* infuus krijgen. Het infuus wordt de ochtend van uw behandeling speciaal voor u klaargemaakt en moet worden vernietigd, als u het infuus die dag niet kunt krijgen.

Wilt u daarom vóórdat u een behandeling krijgt, onderstaande punten controleren? Als u een of meerdere klachten heeft, vragen we u zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Reumatologie. Zo kunnen we tijdig uw afspraak annuleren en voorkomen we uw medicijn onnodig klaar maken.

Het gaat om:

- Koorts
- Keelpijn
- Diarree
- Huidinfecties
- Benauwdheidsklachten of hoesten
- Pijn bij het plassen
- Neusverkoudheid
- Gebruik van antibiotica

- Kortademigheid en gezwollen enkels
- Bijwerkingen van uw vorige infuus met infliximab
- Andere veranderingen
- Twijfel

Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de reumatologieverpleegkundigen via tel. (078) 654 12 35.

Controle

Tijdens de behandeling met infliximab nemen we regelmatig bloed bij u af. Hierbij controleren we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes en lever- en nierfunctie.

Bijwerkingen van infliximab

- Tijdens het geven van infliximab kunnen schommelingen in uw bloeddruk voorkomen. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig uw bloeddruk. Ook kunt u zich licht in uw hoofd voelen of een warm gevoel hebben. Deze klachten nemen meestal snel af nadat het infuus is ingelopen.
- Bij het gebruik van infliximab kan een allergische reactie (huiduitslag) optreden. Meestal gebeurt dat na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de behandeling optreden, maar ook als u weer thuis bent. U moet deze reactie altijd melden aan uw reumatoloog.
Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. De allergische reactie kan een reden zijn om met de behandeling te stoppen.

- Patiënten die infliximab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, zoals een wondje waar pus uitkomt, contact op met uw huisarts of reumatoloog.
- Bij het gebruik van infliximab is er mogelijk een verhoogd risico op het ontstaan van kwaadaardige huidkanker. Als u nieuwe vlekjes of veranderingen van bestaande vlekjes op uw huid ziet, moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van infliximab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Operaties en andere ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van infliximab mogelijk een verhoogd infectierisico na operaties. Het is belangrijk dat u het met uw arts bespreekt als u een operatie of tandheelkundige ingreep krijgt. Vertel ook degene die de ingreep uitvoert, dat u wordt behandeld met infliximab.

Gebruik van infliximab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met infliximab.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u infliximab gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0904