

Nitroglycerine

Spray en tabletten

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u het medicijn nitroglycerine voorgeschreven. In deze folder leest u meer over het gebruik van dit medicijn en de bijwerkingen. We raden u aan deze informatie goed door te lezen.

Nitroglycerine

Nitroglycerine is een medicijn dat de bloedvaten verwijdt. Het medicijn vermindert het zuurstofverbruik van het hart. Ook zorgt het voor een betere aanvoer van zuurstof naar het hart.

Nitroglycerine wordt gebruikt bij pijn op de borst. U kunt het ook gebruiken vlak voordat u meer inspanning dan normaal moet leveren. Hiermee kunt u pijn op de borst voorkomen. Nitroglycerine is er als spray of tablet.

Gebruiksaanwijzing spray

- Probeer voor het sprayen te gaan zitten.
- Houd de spray rechtop.
- Duw de tong tegen uw gehemelte en houd uw adem even in.
- Spray nu onder uw tong in uw mond.
- Sluit uw mond en houd uw adem twee seconden in.

Gebruiksaanwijzing tablet

- Zorg dat u geen etenswaren meer in uw mond heeft.
- Leg een tablet onder uw tong.
- Laat de tablet onder uw tong uiteenvallen. U mag de tablet niet doorslikken!

Nitroglycerine werkt op beide manieren binnen één tot drie minuten.

Als de pijn of beklemming na vijf minuten niet verdwenen is, kunt u nog een spray of tablet nemen. Als uw klachten hierna niet verdwenen zijn, belt u met uw huisarts of specialist.

Bijwerkingen

Als u regelmatig nitroglycerine gebruikt, kunt u last hebben van duizeligheid vooral bij het overeind komen. Deze duizeligheid vermindert als u gaat liggen.

Verder kunt u last hebben van blozen, hoofdpijn, hartkloppingen, vermoeidheid en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen enkele weken.

Als de bijwerkingen aanhouden of erg hinderlijk voor u zijn, kunt u dit met uw huisarts of specialist bespreken.

Belangrijk

Medicijnen tegen hart- en vaatziekten kunnen de bijwerkingen van andere geneesmiddelen versterken. De medewerkers van de apotheek kunnen u hier meer over vertellen.

Zwangerschap en borstvoeding

- Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van het gebruik nitroglycerine tijdens de zwangerschap.
- Het gebruik van nitroglycerine wordt afgeraden in de periode dat u borstvoeding geeft. Er zijn geen gegevens bekend over de risico's voor uw baby.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of uw apotheek.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2019
pavo 0466