

Rituximab

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn rituximab gaat gebruiken. In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft gelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van rituximab

Rituximab is een medicijn dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) tijdelijk uitschakelt. Deze B-lymfocyten maken deel uit van het afweersysteem. Het zijn verdedigers tegen infecties. Ze spelen ook een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en SLE. Bij deze ziekten kan er een overmatige activiteit zijn van de B-lymfocyten. Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan de ziekte tot rust brengen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wie krijgen er rituximab?

Rituximab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis.

Rituximab kan voorgeschreven worden aan patiënten waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met rituximab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat onder andere onderzocht wordt of u in het verleden een tbc-infectie of hepatitis heeft gehad.

Een aantal dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen bij de afdeling Bloedafname van het ziekenhuis. Via dit bloedonderzoek kunnen we vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opsporen.

Als u een afspraak voor het infuus heeft en u weet of vermoedt dat u een infectie heeft, bel dan zo spoedig mogelijk naar de reuma- verpleegkundige. Meestal wordt het infuus dan even uitgesteld.

Het gebruik van rituximab

- Rituximab wordt via een infuus gegeven. Dit gebeurt in het ziekenhuis.
- Het eerste infuus duurt gemiddeld 4-5 uur. Als u tijdens het eerste infuus geen last van bijwerkingen heeft gehad, wordt het tweede infuus meestal in kortere tijd gegeven. Het tweede infuus duurt dan 2,5 tot 3 uur.
- De eerste behandeling met rituximab bestaat uit twee infusen. Twee weken na het eerste infuus, krijgt u het tweede infuus.

Afhankelijk van het ziekteverloop krijgt u na (meestal na zes tot twaalf) maanden opnieuw een infuus.

- Rituximab werkt langzaam in. Daarom duurt het enkele weken tot maanden voordat u het effect merkt.
- De behandeling met rituximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat, prednison of een ander medicijn tegen reuma.

Controle

Tijdens het geven van het infuus controleren we regelmatig uw bloeddruk, pols, hartslag en temperatuur. Ook nemen we meestal bloed bij u af voor controle.

Bijwerkingen van rituximab

- Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, krijgt u voorafgaand aan ieder infuus een anti-allergiemiddel, prednison en paracetamol. Een ongewenste reactie of bijwerking treedt meestal op tijdens het inlopen van het infuus. Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het infuus zijn: jeuk, kortademigheid, koorts, rillingen, huiduitslag en/of schommelingen in de bloeddruk. Krijgt u toch last van bijwerkingen, dan kunnen we het toedienen van de rituximab vertragen of onderbreken.
- Patiënten die rituximab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, zoals een wondje waar pus uitkomt, contact op met uw huisarts of reumatoloog.

- Bij het gebruik van infliximab is er mogelijk een verhoogd risico op het ontstaan van kwaadaardige huidkanker.
Als u nieuwe vlekjes of veranderingen van bestaande vlekjes op uw huid ziet, moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

Belangrijk

Een zeldzame, maar ernstige bijwerking is het optreden van een herseninfectie.

Krijgt u last van één of meerdere van de volgende symptomen, *bel dan meteen* naar uw reumatoloog of huisarts:

- Geheugenverlies
- Moeite met nadenken
- Moeite met lopen
- Vermindering/verlies van uw gezichtsvermogen

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog. Vanwege de lange werkingsduur van rituximab geldt dit tot twaalf maanden na uw laatste behandeling met rituximab.

Vaccinaties

Vaccinaties moeten minstens vier weken voor de eerste behandeling met rituximab plaatsvinden.

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Reisadvies

We raden u af om bij gebruik van rituximab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Operaties en andere ingrepen

Er is een verhoogd risico op infecties na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u rituximab gebruikt. Als u een geplande operatie moet ondergaan adviseren wij u om twee maanden voor deze operatie geen rituximab meer te gebruiken. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer rituximab gaan gebruiken.

Krijgt u een tandheelkundige behandeling, waarbij u kunt gaan bloeden? Overleg dan vooraf met uw reumatoloog of het nodig is dat u preventief een antibioticakuur krijgt.

Gebruik van rituximab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met rituximab.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u rituximab gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0908