

Stoppen met medicijnen voor een spirometrie met medicinale effecten

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U krijgt binnenkort een spirometrie met medicinale effecten. Hiervoor is het nodig dat u stopt met de medicijnen die hierna worden genoemd. Meer informatie over de test leest u in de folder 'Longfunctieonderzoeken'.

- **Minimaal 8 uur vóór de spirometrie**

U stopt met de kortwerkende longmedicijnen.

- Airomir (Salbutamol)
- Atrovent (Ipratropiumbromide)
- Ventolin (Salbutamol)

- **Minimaal 12 uur vóór de spirometrie**

U stopt met de kortwerkende longmedicijnen.

- Berodual (Ipratropiumbromide/
Fenoterolhydrobromide)
- Berotec (Fenoterol)
- Bricanyl (Terbutaline)
- Combivent (Salbutamol/Ipratropium)

- **Minimaal 24 uur vóór de spirometrie**

U stopt met de langwerkende longmedicijnen.

- Aerivio Spiromax (Salmeterol/Fluticason)
- AirBuFo (Formoterol/Budesonide)
- AirFluSal Forspiro (Salmeterol/Fluticason)
- Atimos (Formoterol)
- Bufoler Easyhaler (Formoterol/Budesonide)
- Busalair Axahaler (Salmeterol/Budesonide)
- Duaklir Genuair (Acidiniumbromide/
Formoterol)
- DuoResp Spiromax (Formoterol/Budesonide)
- Eklira Genuair (Acidiniumbromide)
- Elpenhaler (Salmeterol/Fluticason)

- Flutiform (Fluticason/Formoterol)
- Foradil (Formoterol)
- Foster (Formoterol/Beclometason)
- Oxis (Formoterol)
- Semprex (Acrivastine)
- Seretide (Salmeterol/Fluticason)
- Serevent (Salmeterol)
- Singulair (Montelukast)
- Symbicort (Formoterol/Budesonide)
- Tavegil (Clemastine)
- Vincion (Salmeterol/Fluticason)

- **Minimaal 48 uur vóór de spirometrie**

U stopt met de langwerkende longmedicijnen.

- Anoro (Umeclidinium/Vilanterol)
- Bevespi (Glycopyrronium/Formoterol)
- Daxas (Roflumilast actieve metaboliet)
- Incruse Ellipta (Umeclidinium)
- Onbrez (Indacaterol)
- Relvar (Vilanterol/Fluticason)
- Seebri (Glycopyrronium)
- Spiolto Respimat (Tiotropium/Olodaterol)
- Spiriva (Tiotropium bromide)
- Striverdi Respimat (Olodaterol)
- Theolair (Theofylline)
- Tiotrus (Tiotropium bromide)
- Trelegy Ellipta (Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol)
- Trimbow (Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium)
- Trixeo Aerosphere (Budesonide/Formoterol/Glycopyrronium)
- Ultibro (Indacaterol/Glycopyrronium)
- Unilair (Theofylline)

• **U hoeft *niet* te stoppen met:**

- Alvesco (Ciclesonide)
- Flixotide (Fluticason)
- Lomudal (Cromoglicinezuur)
- Pulmicort (Budesonide)
- Qvar (Beclometason)
- Tilade (Nedocromil)
- Neussprays
- Andere medicijnen

Twijfelt u over een medicijn? Bel dan gerust voor overleg naar de afdeling Longfunctie, tel. (078) 652 33 28. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2023
pavo 1745