

Sulfasalazine (Salazopyrine®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u sulfasalazine gaat gebruiken. In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft gelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking en toepassing

Sulfasalazine is een zogenaamde DMARD (disease modifying anti rheumatic drug), oftewel een reuma bestrijdend medicijn.

Sulfasalazine wordt voorgeschreven aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en artritis psoriatica.

Sulfasalazine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Het duurt ongeveer zes tot twaalf weken voordat u wat gaat merken van de werking van dit medicijn. Dit medicijn wordt vaak met andere medicijnen gecombineerd. Als blijkt dat u goed op sulfasalazine reageert, kunt u het vele jaren blijven gebruiken. De dosering van sulfasalazine wordt in de loop van de behandeling aangepast.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het gebruik van sulfasalazine

Sulfasalazine is een medicijn in tabletvorm van 500 mg. Het aantal tabletten dat u moet slikken wordt geleidelijk opgehoogd. Dit is om de kans op bijwerkingen te verminderen. Uiteindelijk gebruikt u vier tot zes tabletten per dag.

Als na verloop van tijd de ziekteactiviteit (mate van de ontstekingen) laag is, wordt de dosering soms verlaagd.

- U neemt de ene helft van de tabletten 's morgens in en de andere helft 's avonds.
- U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.
- Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op misselijkheid.
- Dit medicijn bevat sulfonamide (bepaald antibioticum). Als u overgevoelig bent voor sulfonamide, meld dit dan aan uw reumatoloog.
- Stop niet zomaar met het gebruik van sulfasalazine. Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

Bijwerkingen

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meeste bijwerkingen komen zelden voor.

Mogelijke bijwerkingen van sulfasalazine zijn:

- Maagdarmklachten zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken en diarree. Deze klachten treden vooral tijdens het begin van de behandeling op.

- Hoofdpijn en soms duizeligheid.
- Afwijkingen in het bloedbeeld, de nierfunctie en leverfuncties. De reumatoloog controleert daarom regelmatig uw bloed.
- Overgevoelighedsreacties zoals huidafwijkingen, koorts of koude rillingen.
- Oranje verkleuring en/of veranderde geur van de urine. Deze bijwerking is onschuldig.

Heeft u last van een bijwerking of andere lichamelijke klachten? En vraagt u zich af of ze met het gebruik van sulfasalazine te maken hebben? Neem dan contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Controle

Tijdens de behandeling met sulfasalazine wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de tabletten.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Tijdens het gebruik van dit medicijn kunnen mannen tijdelijk minder vruchtbaar zijn. Nadat het medicijn gestopt is wordt de spermaproductie weer normaal.
- Bij vrouwen heeft sulfasalazine geen invloed op de vruchtbaarheid.

- Sulfasalazine kan zonder gevaar voor en tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
- Sulfasalazine kan in doseringen tot 2 gram per dag tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.
- Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts.

Gebruik van sulfasalazine samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met sulfasalazine.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van het ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Alcohol

Overleg met uw reumatoloog over het gebruik van alcohol.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0909