

Metopirontest

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u een metopirontest afgesproken. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

De bijnieren produceren onder andere het hormoon Cortisol. Metopiron is een medicijn dat gebruikt wordt om de samenwerking tussen de hersenen en de bijnier, voor de productie van cortisol, te testen.

Vorbereiding

Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen.

Het onderzoek

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Opname in het ziekenhuis

Voor dit onderzoek wordt u een nacht in het ziekenhuis opgenomen.

De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje in. Dit is om zo nodig direct medicijnen via de bloedbaan te kunnen geven en om bloed af te nemen.

Als er nog geen recent gewicht van u bekend is dan wordt u gewogen om de dosering van de metopiron te kunnen bepalen.

U bent nuchter vanaf 22.00 uur. U heeft vanaf het moment dat de test gaat beginnen tot het einde van de test bedrust. Om 23.00 uur komt de verpleegkundige uw bloeddruk en polsfrequentie opmeten. Daarna kunt u de metopiron-tabletten innemen met wat yoghurt of melk. U kunt van de tabletten misselijk of duizelig worden. Dit meldt u bij de verpleegkundige. Wanneer u lactose-intolerant bent vragen wij u om zelf yoghurt of melk mee te nemen. Deze kunt u dan gebruiken voor het innemen van de tabletten.

De volgende ochtend neemt de verpleegkundige tussen 08.00-09.00 uur bloed af en meet de bloeddruk en de polsfrequentie. Na deze bloedafname wordt het infuusnaaldje verwijderd. U mag dan weer eten. Een uur na de bloedafname wordt er nogmaals de bloeddruk en polsfrequentie gemeten. Na beoordeling van de bloeddruk mag u naar huis.

Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

De uitslag

Tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw behandelend arts krijgt u de uitslag van het onderzoek.

Tot slot

Als u verhinderd bent, wilt u dan zo spoedig bellen naar afdeling D3? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de verpleegkundigen van afdeling D3, tel. (078) 652 38 51 en vraag naar de endocrinologie-verpleegkundige. Als de verpleegkundige op dat moment niet aanwezig is, wordt u teruggebeld.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2024
pavo 0889