

Losmaken van de voorhuid

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort wordt bij uw zoon zijn voorhuid losgemaakt. In deze folder leest u meer over de operatie en de verzorging thuis.

Vernauwde voorhuid

De voorhuid bedekt de eikel of de glans van de penis. Tot aan de leeftijd van tien tot twaalf jaar is de voorhuid soms verkleefd aan de eikel. Hierdoor kan het 'velletje' niet teruggetrokken worden, waardoor de eikel niet helemaal vrij komt. Dit komt vaker voor bij jongens op die leeftijd en behandeling is dan ook niet nodig. Meestal komt de voorhuid met het ouder worden vanzelf (losser en wijder) los van de eikel.

Als uw zoon rond de 10-12 jaar is en de voorhuid is nog steeds vernauwd, kan de arts besluiten deze los te maken. Zo wordt voorkomen dat de voorhuid zo vast komt te zitten aan de eikel dat hij niet meer losgemaakt kan worden. Er kunnen dan ontstekingen volgen, waarbij de voorhuid opzwellt en rood wordt. Bij een ontsteking ontstaat er soms dan ook wat pus tussen de voorhuid en de glans van de penis. Dit kan erg pijnlijk zijn. Als uw zoon regelmatig ontstekingen heeft, is het soms nodig om al voor zijn twaalfde jaar de voorhuid los te maken.

De operatie

Het losmaken van de voorhuid is een korte operatie van ongeveer vijf minuten en gebeurt op de operatieafdeling onder narcose. Het is een dagopname. Dit betekent dat uw kind dezelfde dag weer mee naar huis mag. De operatie wordt gedaan door de uroloog.

Tijdens de operatie wordt de voorhuid losgemaakt. De voorhuid wordt als het ware 'losgetrokken' en daardoor ontstaat er een soort schaafplek op de eikel. Er wordt niet gesneden en worden geen hechtingen en verband gebruikt. Na de operatie moet uw zoon eerst geplast hebben voordat hij weer naar huis mag.

Verzorging thuis

De verzorging begint de dag na de operatie.

- U moet de voorhuid twee keer per dag helemaal naar achter schuiven, zodat de eikel volledig zichtbaar is. Dit is erg belangrijk, omdat de voorhuid anders weer vast kan gaan zitten!!
- U moet de 'schaafplek' twee keer per dag insmeren met Terra Cotril oogzalf. Voor deze zalf krijgt u een recept mee na de operatie.
- U kunt de 'schaafplek' twee tot drie keer per dag insmeren met lidocaïne-zalf. Deze zalf heeft een verdovende werking en verzacht de pijnlijke 'schaafplek'. Ook dit recept krijgt u mee.
- Als het nodig is, kunt u uw kind paracetamol geven volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Het plassen kan de eerste keren pijnlijk zijn, omdat er een 'schaafplek' is.

Mogelijke complicaties

- Ontsteking van de penis, zoals roodheid en zwelling (dikker worden).
- Weer vast gaan zitten van de voorhuid. Dit kan al binnen een week gebeuren.

Als u hier last van krijgt, belt u naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Bij complicaties buiten deze tijden belt u naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis en vraagt naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 654 11 11.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens bovengenoemde tijden naar de polikliniek Urologie. Ook voor het maken of verzetten van een spraak belt u naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 0157