

# Losmaken van de voorhuid

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

Binnenkort wordt bij uw zoon zijn voorhuid losgemaakt. In deze folder leest u meer over de operatie en de verzorging thuis.

## Vernauwde voorhuid

De voorhuid bedekt de eikel van de penis. Tot aan de puberteit is de voorhuid soms verkleefd aan de eikel. Hierdoor kan het 'velletje' niet teruggetrokken worden, waardoor de eikel niet helemaal vrij komt. Dit komt vaker voor. Meestal is behandeling niet nodig omdat de voorhuid met het ouder worden vanzelf losser komt van de eikel.

Als uw zoon rond de 10-12 jaar is en de voorhuid is nog steeds verkleefd, kan de arts in overleg met u besluiten deze los te maken.

## De operatie

Het losmaken van de voorhuid is een korte operatie van ongeveer vijf minuten en gebeurt op de operatieafdeling onder narcose. Het is een dagopname. Dit betekent dat uw kind dezelfde dag weer mee naar huis mag. De operatie wordt gedaan door de uroloog. Tijdens de operatie wordt de voorhuid losgemaakt. De voorhuid wordt als het ware 'losgetrokken' en daardoor ontstaat er een soort schaafplek op de eikel. Er wordt niet gesneden en worden geen hechtingen en verband gebruikt. Na de operatie moet uw zoon eerst geplast hebben voordat hij weer naar huis mag.

# Verzorging thuis

De verzorging begint de dag na de operatie.

- U moet de voorhuid bij elke keer plassen en daarnaast ook twee keer per dag onder de douche helemaal naar achter schuiven, zodat de eikel volledig zichtbaar is. Dit is erg belangrijk, omdat de voorhuid anders weer vast kan gaan zitten!!
- U kunt de voorhuid en eikel meerdere keren per dag insmeren met vaselinezalf. Deze zalf kunt u kopen bij de drogist. De zalf voorkomt dat de voorhuid en eikel weer aan elkaar vast gaan plakken. Soms krijgt u nog een extra zalf mee op recept. Dit krijgt u wanneer er duidelijk een 'schaafplek' te zien is. In dat geval smeert u meerdere keren de vaselinezalf en daarnaast twee keer per dag deze extra zalf op de 'schaafplek'.
- Als het nodig is, kunt u uw kind paracetamol geven volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Het plassen kan de eerste keren pijnlijk zijn, omdat er een 'schaafplek' is. Zorg ervoor dat uw zoon vooral goed blijft drinken zodat de urine minder geconcentreerd is.

## Mogelijke complicaties

- Het ziet er cosmetisch niet fraai uit, dit trekt vanzelf in de loop van enkele weken bij.
- Weer vast gaan zitten van de voorhuid. Dit kan al binnen een paar dagen gebeuren.

Als u het na de ingreep niet vertrouwt of vragen heeft belt u naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur.

Bij acute problemen buiten deze tijden belt u naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis en vraagt naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 654 11 11.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens bovengenoemde tijden naar de polikliniek Urologie. Ook voor het maken of verzetten van een spraak belt u naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)





Albert Schweitzer ziekenhuis  
augustus 2024  
pavo 0157