

# PRP

## Penicilline Resistente Pneumokok

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie



# Inleiding

Uit onderzoek is gebleken dat u drager bent van een Penicilline Resistente Pneumokok (PRP).

Het Albert Schweitzer ziekenhuis treft, net als alle andere Nederlandse ziekenhuizen, maatregelen om verspreiding van PRP te voorkomen.

In deze folder leest u meer over de PRP en de maatregelen die nodig zijn om verspreiding te voorkomen.

## Registratie

In uw elektronisch patiëntdossier zetten wij een melding dat u drager bent van de PRP. Deze melding zorgt ervoor dat bij een (eventueel) volgend bezoek van u aan het Albert Schweitzer ziekenhuis, zichtbaar is dat u een PRP bij u draagt. Zo nodig kunnen we dan isolatiemaatregelen nemen.

## Pneumokok

Een pneumokok is een bacterie die van nature voorkomt in de neusholte, zonder ziekteverschijnselen te geven. De pneumokok kan onder andere oorontsteking en longontsteking veroorzaken. De pneumokok die van nature in de neusholte voorkomt, is goed te behandelen met penicilline. Dit is een medicijn dat bacteriën doodt. De PRP is ongevoelig geworden voor penicilline en daardoor moeilijker te behandelen.

Iemand die drager is van een PRP heeft daar meestal geen klachten van. Als drager kunt u de bacterie wel verspreiden naar andere mensen.

## **Wie kunnen PRP bij zich dragen?**

Iedereen die in contact komt met een PRP kan deze bacterie oplopen.

## **Dragerschap en behandeling**

Bij dragerschap met een PRP wordt geen behandeling met antibiotica gegeven, omdat dit niet zinvol is.

Soms kan naast dragerschap ook een infectie met een PRP ontstaan. Infecties worden wel behandeld met antibiotica.

## **De gevolgen in een ziekenhuis**

In een ziekenhuis kan een PRP ernstige problemen veroorzaken. Er zijn veel mensen bij elkaar, waardoor de kans op overdracht groter is. Veel ziekenhuispatiënten hebben minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties. In het ziekenhuis proberen we deze verspreiding tegen te gaan door patiënten, die (mogelijk) een PRP bij zich dragen, geïsoleerd te verplegen.

# Maatregelen tegen verspreiding

## Isolatiemaatregelen bij opname

Als u (mogelijk) drager bent van een PRP gelden de volgende isolatiemaatregelen:

- U wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
- U mag uw bed of uw kamer alleen verlaten na overleg met de verpleegkundige.
- Ziekenhuismedewerkers dragen een masker en als zij u verzorgen ook een schort en handschoenen.
- Uw familie kan uw was mee naar huis nemen. De was moet thuis op 60°C worden gewassen.

## Bezoek

Bezoekers hoeven geen masker, schort en handschoenen te dragen. Zij hoeven alleen hun handen te desinfecteren als zij naar huis gaan.

## Isolatiemaatregelen op de polikliniek

Op de polikliniek zijn geen isolatiemaatregelen nodig.

## Opheffen van de isolatiemaatregelen

Het is tot nu toe niet bekend hoe lang u drager kunt blijven. Om te controleren of u nog drager bent, kan 2 maanden nadat de PRP voor het eerst bij u is gevonden, een controle worden gedaan. Voor dit onderzoek wordt met een wattenstok een uitstrijk gemaakt van uw keel. Als u sputum opgeeft wordt dit onderzocht.

Als in twee opeenvolgende onderzoeken met een tussenpoos van 1 dag geen PRP wordt aangetoond wordt u 'PRP-vrij' verklaard. Dit PRP onderzoek wordt in principe alleen afgenomen als u in het ziekenhuis bent opgenomen.

# Meldingen andere zorginstellingen/hulpverleners

Als u contact heeft met andere hulpverleners, zoals fysiotherapie of thuiszorg of een ander ziekenhuis bezoekt, dan vragen wij u hen te vertellen over uw PRP-dragerschap.

## Thuisituatie

PRP verspreidt zich niet snel tijdens oppervlakkig sociaal contact in de thuisituatie. Het is niet nodig om speciale maatregelen te nemen als u thuis bent.

## Tot slot

We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Bij vragen en eventuele problemen kunt u tijdens uw opname contact opnemen met uw arts of de verpleegkundige. Als u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar de afdeling Infectiepreventie. De afdeling is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
mei 2019  
pavo 1524