

Echo barbotage

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

In deze folder leest u meer over een barbotage van een of meerdere pezen rondom het schouder-, pols-, heup-, knie- of enkelgewricht. Dit is een echografische behandeling waarbij er kalk in één of meerdere van uw pezen wordt behandeld.

U heeft een afspraak

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis:

- Locatie Dordwijk
- Locatie Zwijndrecht

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie bij de balie van de afdeling Radiologie.

Doel van de behandeling

Bij een barbotage wordt er kalk in één of meerdere van uw pezen klein gemaakt en indien mogelijk afgezogen. De aanwezige kalk is te compact en teveel om door het lichaam te worden afgebroken. Door het fragmenteren (klein maken) van de kalk en de daardoor ontstane veranderde doorbloeding op die plek, breken de stukjes kalk door naar de slijmbeurs en kan het lichaam het verder afbreken en afvoeren.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Vervoer naar huis

Het gewricht waar de barbotage plaatsvindt, wordt tijdens de behandeling verdoofd. U mag daarom de eerste 24 uur na de behandeling zelf **geen** voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

Allergisch

Bij deze behandeling worden de middelen: Bupivacaine® en Depo-Medrol® gebruikt. Allergie voor de gebruikte middelen is uiterst zeldzaam. Mocht u toch allergisch zijn, meldt u dit dan van tevoren door te bellen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

De behandeling

De behandeling wordt op de afdeling Radiologie uitgevoerd door een radioloog, een arts-assistent in opleiding of een gespecialiseerd laborant.

In de echografiekamer ligt u op uw rug, halfzittend of zittend op de onderzoekstafel, afhankelijk van het te behandelen gewricht. De betreffende schouderpezen worden met echografie in beeld gebracht. Vervolgens wordt de plek gedesinfecteerd met alcohol.

Als eerste krijgt u een verdoving ingespoten in de huid en de omgeving van het te behandelen gewricht.

Vervolgens wordt, als de verdoving is ingewerkt, de kalk aangeprikt en zoveel mogelijk gefragmenteerd. Dit duurt, afhankelijk van de hoeveelheid en de samenstelling van de kalk, tussen de 5 tot 10 minuten.

Als laatste wordt een vloeistof achtergelaten in uw slijmbeurs. De vloeistof bestaat uit een mix van een verdovende vloeistof (Bupivacaïne®) en een ontstekingsremmer (Depo-Medrol®). De naald wordt weer verwijderd en op het wondje wordt een pleister geplakt.

De totale behandeling duurt ongeveer 5 tot 10 minuten, afhankelijk van het te behandelen gewricht.

Na de behandeling

U mag zelf de eerste 24 uur **geen** voertuig besturen.

U kunt verder uw dagelijkse activiteiten weer hervatten. Probeer de eerste dagen zware belasting te vermijden. Als de pijn het toelaat, moet u rustig het betreffende gewricht blijven bewegen.

Controle afspraak

Na 4 tot 6 weken heeft u een afspraak bij de arts die de behandeling heeft aangevraagd. Dit kan uw huisarts zijn of de orthopeed. De arts bespreekt met u of de injectie geholpen heeft. Als het goed is heeft u al een controle afspraak staan. Zo niet, belt u dan naar uw huisarts of naar de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70.

Complicaties en bijwerkingen

In de eerste uren direct na het onderzoek, kan de behandelde pees gevoelloos of stijf aanvoelen. De schouder kan ook stijf aanvoelen. Schrikt u hier niet van, dit is altijd tijdelijk.

Ook kan de injectieplaats een aantal dagen na het onderzoek wat pijnlijker aanvoelen. Er kan een bloeditstorting (blauwe plek) of een zwelling ontstaan.

De eerste dagen kan u tegen de pijn paracetamol gebruiken volgens de bijsluiter.

Een bijwerking van Depo-medrol® is het hebben van aanvallen van warmte en roodheid in het gelaat, zogenaamde flushes. Ook dit is van tijdelijke aard en niet gevaarlijk.

Als u suikerziekte heeft, kan dit ontregeld raken. Als uw glucosewaardes anders worden dan u gewend bent, neemt u dan contact op met de arts die momenteel uw suikerziekte controleert. Dit is meestal de huisarts of internist.

Tot slot

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor het onderzoek wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch laten weten? De opgevallende plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 09.00 -16.00 uur bellen naar de afdeling Radiologie van locatie Dordwijk, tel. (078) 654 71 90.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen, kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2020
pavo 0005