

Medicijnen voor thuis

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Overzicht medicijnen

Pijnstillers	Dosering per dag	Aandachtspunten
Paracetamol tabletten van mg om de uur	
Naproxen tabletten van mg om de uur	
Ibuprofen tabletten van mg om de uur	
Diclofenac tabletten van mg om de uur	
Morfine tabletten van mg om de uur	
Andere medicijnen		
Macrogol tabletten van mg om de uur	
 tabletten van mg om de uur	
 tabletten van mg om de uur	

Medicijn	Dosering per dag	Aandachtspunten
 tabletten van mg om de uur	
 tabletten van mg om de uur	
 tabletten van mg om de uur	

Instructies

- Gebruik uw pijnstilling zoals voorgeschreven door uw arts.
- Lees de bijsluiters van de medicijnen goed door.
- Blijft u pijn houden of u heeft bijwerkingen? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist.
- In de meeste gevallen kunt u na enige tijd beginnen met het afbouwen van de pijnstillers.
Begin met afbouwen van de zwaarste pijnstillers (morphine), daarna de diclofenac/ibuprofen/naproxen en als laatste de paracetamol. Doe dit stapsgewijs: neem per dag 1 dosering minder in. Stop als laatste met de avonddosering.

Contactgegevens

Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk (hoofdlocatie), Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht, tel. (078) 654 11 11.
Afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Albert Schweitzer ziekenhuis
september 2021
pavo 1716