

# Doorprikken van het trommelveelies bij kinderen

onder algehele anesthesie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

## informatie



# Inleiding

Uw kind heeft regelmatig last van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed horen. Daarom heeft de KNO-arts voorgesteld om de trommelvliezen van uw kind onder algehele anesthesie door te prikken. In deze folder leest u hier meer over

## Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, belt een medewerker van de OK planning van de KNO poli u om een opnamedatum af te spreken.

## Opnametijd

U belt één werkdag voor de operatie tussen 15.00 -16.00 uur naar de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar uw kind wordt opgenomen. U hoort dan het tijdstip van de opname en het tijdstip van de operatie.

Als de operatie van uw kind op maandag is, belt u op vrijdag.

## Telefoonnummers


- Locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97
- Locatie Dordwijk (078) 652 34 13

# De oren

Tijdens een verkoudheid is het gehoor van uw kind vaak wat slechter. U merkt hierdoor niet meteen dat er iets aan de hand is. Uw kind kan soms wat minder geconcentreerd zijn. Ook kunt u het gevoel hebben dat uw kind niet wil luisteren. Later blijkt dan vaak dat uw kind niet goed kan horen. Als het gehoorverlies wat langer duurt, kunnen er problemen op school ontstaan. De schoolarts is vaak de eerste die de gehoorstoornis opmerkt.

Het oor bestaat onder andere uit de volgende delen:


- De uitwendige gehoorgang.
- Het trommelvlies, met daarachter het middenoor en drie gehoorbeentjes. Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met de keelholte.
- Het gehoororgaan. Dit ligt in het binnenste van het oor, ook wel slakkenhuis genoemd.



Via de gehoorgang komen geluidstrillingen bij het trommelvlies terecht. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes zorgen ervoor dat de trillingen naar het slakkenhuis gevoerd worden. In het slakkenhuis worden deze trillingen omgezet in zenuwprikkels. Die zenuwprikkels worden naar de hersenen gevoerd. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we kunnen horen.

Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht door. De luchtdruk in het middenoor blijft zo gelijk met de luchtdruk buiten. Soms werkt de buis van Eustachius bij kinderen minder goed. Er ontstaat dan een onderdruk in het middenoor.

Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat dit nu teveel slijm aanmaken. De holte wordt daardoor langzaam gevuld met vloeistof. Na enige tijd verandert deze vloeistof in dik slijm. Dit dikke slijm remt de trilling van het trommelvlies. Het gevolg is dat uw kind minder goed kan horen.



### **Doorprikken**

Als uw kind problemen met de oren heeft, dan kan dit meestal opgelost worden door het trommelvlies van één of beide oren door te prikken. Dit noemen we ook wel paracentese.

## **Vorbereiding**

Voor het doorprikken van het trommelvlies wordt uw kind een aantal uren in het ziekenhuis opgenomen

### **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder kind dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het de verpleegafdeling als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Om uw kind voor te bereiden op deze opname kunt u via onze website, [www.kno.asz.nl](http://www.kno.asz.nl) het filmpje 'Verwijderen van keel- en neusamandelen bij kinderen' van ons ziekenhuis bekijken.

Hoewel uw kind een andere operatie krijgt en sommige dingen dus iets anders zullen verlopen, geeft dit filmpje wel een goed beeld over de gang van zaken op onze kinderafdeling.

## **De opname**

Meer informatie over de opname van uw kind leest u in de folder 'Welkom met uw kind op afdeling ODZ'.

U leest meer over de gang van zaken rondom de anesthesie in de folder 'Anesthesie en pre-operatieve screening bij kinderen'.

## **De operatie**

De KNO-arts maakt een klein gaatje of sneetje in het trommelvlies en zuigt het vocht uit het middenoor weg. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen daardoor weer normaal werken en het gehoor verbetert.

De operatie duurt ongeveer 10-15 minuten.

# Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. In deze ruimte komt uw kind onder toezicht van verpleegkundigen en de anesthesioloog bij uit de narcose. U of uw partner mag bij uw kind zijn. Na deze operatie zijn kinderen al snel wakker, soms al iets eerder dan u bij uw kind bent. Dit is helaas niet te voorkomen.

De KNO-arts loopt langs en vertelt hoe de operatie is verlopen. Nadat de anesthesioloog toestemming heeft gegeven, worden u en uw kind naar de Kinderdagbehandeling teruggebracht.

Misschien is uw kind nog wat suf of slaperig van de anesthesie. Het kan ook zijn dat uw kind verdrietig en/of overstuur is door wat er gebeurd is, voor een deel mogelijk door de pijn.

Het kan zijn dat er bij uw kind wat bloed of vocht uit de oren komt. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. U mag uw kind op schoot nemen om te troosten. Sommige kinderen zijn wat misselijk na de operatie.

Uw kind mag meteen wat eten en drinken. Op de afdeling is er koffie en thee voor u.

Als alles goed verloopt, mag uw kind na een paar uur het ziekenhuis weer verlaten.

# Naar huis

## **Belafsprak**

U krijgt een belafsprak voor de polikliniek KNO. U kunt eventueel een mobiel telefoonnummer doorgeven aan de polikliniek KNO. Na twee weken bellen wij u om te vragen hoe het met uw kind gaat.

## **Pijnstilling**

Als uw kind pijn heeft, dan kunt u paracetamol geven. Op de verpakking staat de dosering.

## **Naar buiten**

Uw kind mag de dag na de operatie naar buiten en naar school.

## **Oren droog houden**

- De eerste week na de operatie mag er geen water in het oor komen. Bij het haren wassen kunt u vette watten gebruiken om de oren af te sluiten. Deze kunt u bij de drogist of apotheek kopen.
- Na twee weken mag uw kind weer zwemmen.

## **Risico's**

Bij iedere operatie is er enig risico. Zo kan er bijvoorbeeld een infectie ontstaan. De eerste dagen kan er vocht, pus of een druppeltje rood bloed uit het oor komen. Dit is normaal.

Als uw kind na de operatie koorts (39°C) krijgt of er veel bloed of pus uit het oor komt kan er een infectie of een nabloeding zijn. Belt u dan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.

's Avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.



# Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO of naar de afdeling waar uw kind opgenomen wordt.

- Polikliniek KNO (078) 654 71 00
- ODZ, locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97

Heeft u vragen over uw operatieplanning dan kunt u bellen met de OK- planning KNO, tel (078) 654 71 46.

Meer informatie over behandelingen en ziekten van Keel, Neus en Oren kunt u lezen op de website [www.kno.nl](http://www.kno.nl). Wilt u meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de afdeling KNO, kijkt u dan op [www.kno.asz.nl](http://www.kno.asz.nl)

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

*De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)*

# Ruimte voor aantekeningen



Albert Schweitzer ziekenhuis  
april 2021  
pavo 0849