

Mictiecystografie

Op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een mictie cystografie. In deze folder leest u hier meer over.

Een mictie cystografie

Een mictie cystografie is een onderzoek waarbij uw blaas en urine-wegen zichtbaar worden gemaakt met behulp van ingebrachte contrastvloeistof en röntgenfoto's. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie en wordt uitgevoerd door een radioloog en radiodiagnostisch laboranten.

Dit onderzoek kan ook bij kinderen worden gedaan. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Mictiecystogram. Informatie voor ouders/verzorgers'.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De voorbereiding

- Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan voor het onderzoek contact op met de afdeling radiologie.
- Voor dit onderzoek moet uw blaas leeg zijn. Als u geen blaaskatheter heeft, vraagt de röntgenlaborant u uit te plassen.
- Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastvloeistof is het belangrijk dat u van tevoren belt met de afdeling Radiologie.

Het onderzoek

De röntgenlaborant brengt u naar een kleedkamer en vraagt u uw kleding uit te trekken en sieraden af te doen. U mag wel een T-shirt zonder knopen dragen.

U gaat liggen op de röntgentafel. Als u nog geen urinekatheter heeft, dan wordt deze door de arts ingebracht. Dit kan een wat branderig gevoel of een gevoel van aandrang geven. Als de katheter op zijn plaats zit, wordt het branderige gevoel minder.

Via de katheter wordt uw blaas gevuld met contrastvloeistof. Als uw blaas helemaal vol is, wordt er een röntgenfoto gemaakt. Daarna wordt de katheter, indien mogelijk, weer verwijderd.

Uw blaas is nog gevuld met contrastvloeistof. Vervolgens wordt u gevraagd om liggend op de röntgentafel uit te plassen. Tijdens het plassen worden weer röntgenfoto's gemaakt. Het is dus belangrijk dat u tijdens het plassen stil blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt gedurende enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens en na het plassen.

Als u koorts krijgt met een temperatuur boven 38,5°C adviseren wij u contact op te nemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

De uitslag

Als de uroloog het onderzoek heeft aangevraagd, dan komt u ongeveer een week na het onderzoek bij hem terug. Hiervoor maakt u zelf een afspraak bij de polikliniek Urologie.

Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, dan is de uitslag na ongeveer een week bij uw huisarts bekend.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u dan zo spoedig bellen? De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Geeft hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2022
pavo 0114