

COVID-19

Maatregelen tegen verspreiding

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft van uw arts gehoord dat u of uw kind COVID-19 heeft.

Om verspreiding van het virus in het ziekenhuis te voorkomen worden extra maatregelen genomen. In deze folder leest u meer over COVID-19 en de maatregelen.

Daar waar 'u' staat kunt u ook 'uw kind' lezen, als uw kind het virus heeft.

Symptomen van COVID-19

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2.

De meest voorkomende ziekteverschijnselen van COVID-19 zijn:

- Luchtwegklachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of
- Griepverschijnselen (koorts boven 38°C, algeheel ziek voelen, spier- of gewrichtspijn.
- Maar ook extreme vermoeidheid, pijn achter de ogen, (onverklaarbare) diarree, reukverlies en/of smaakverlies kunnen verschijnselen van COVID-19 zijn.

Verspreiding van het virus

Het virus kan zich via de lucht verspreiden via druppeltjes en via direct lichamelijk contact.

Iedereen die binnen 1½ meter van u is geweest of die lichamelijk contact met u heeft gehad kan besmet zijn geraakt met het virus.

Mensen die met u contact hebben gehad, kunnen tot 14 dagen na het contact nog ziek worden.

Isolatiemaatregelen

Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, worden de volgende isolatiemaatregelen genomen:

- U wordt verpleegd in een eenpersoonskamer of in een meerpersoonskamer met andere patiënten die COVID-19 hebben. Het kan zijn dat u hiervoor naar een andere afdeling wordt overgeplaatst.
- U mag de kamer niet verlaten, behalve voor onderzoek of behandeling.
- De deur van uw kamer wordt zoveel mogelijk gesloten gehouden.
- Ziekenhuismedewerkers die de kamer binnenkomen dragen een mond-neus-masker en als zij u aanraken een schort en handschoenen.
- Als u de kamer of afdeling moet verlaten, draagt u een mond-neus masker.
- De familie kan de was mee naar huis nemen. De was moet thuis op 60°C worden gewassen.

Opheffen isolatie

De isolatie mag worden opgeheven als:

- U 24 uur klachtenvrij bent en u minimaal 5 dagen geleden ziek bent geworden.
- Als u na 5 dagen nog klachten heeft, blijft u in isolatie. De isolatie mag worden opgeheven zodra u 24 uur klachtenvrij bent of maximaal 14 dagen na de eerste ziektedag.
- Soms is het nodig dat er voorafgaand aan het opheffen van de isolatie eerst een COVID-19 test afgenomen wordt. Uw arts bepaald of dit nodig is.

Onderzoek of behandeling

COVID-19 kan een reden zijn om onderzoek of behandeling uit te stellen. De behandelend arts beoordeelt of het uitstellen van het geplande onderzoek of behandeling verantwoord is.

Bezoek

- Bezoekers moeten zich eerst melden bij de balie van de verpleegafdeling.
- Bezoekers moeten tijdens het bezoek een mond-neus masker dragen
- Als bezoekers meer mensen in het ziekenhuis willen bezoeken, dan bezoeken zij eerste de andere patiënten en komen als laatste bij u of uw kind.
- Bezoekers moeten gelijk nadat zij u hebben bezocht het ziekenhuis verlaten.

- Als bezoekers zich goed houden aan de voorgeschreven maatregelen, is er voor hen geen besmettingsgevaar.

Tot slot

Wij beseffen dat sommige maatregelen niet prettig zijn. We hopen dat u er begrip voor heeft. Heeft u nog vragen? Stel die dan gerust aan uw arts of de verpleegkundige.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 1612