

Angiografie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis



Inleiding

Angiografie betekent letterlijk het 'afbeelden van bloedvaten'. Bij dit onderzoek worden met contrastmiddel foto's gemaakt van de bloedvaten om te kijken of er afwijkingen zijn.

De specialist heeft met u besproken dat u dit onderzoek binnenkort ondergaat. Inmiddels staat u hiervoor op de wachtlijst. U wordt door het ziekenhuis gebeld voor het maken van de afspraak.

Het onderzoek vindt plaats in het operatiecomplex van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk.

Vorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u de bloedverdunnende medicijnen Sintrommitis (acenocoumarol), Marcoumar (fenprocoumon) of NOAC's (nieuwe orale anti coagulantia)? Dan moet u in overleg met uw specialist enkele dagen voor het onderzoek stoppen met het innemen van deze medicijnen. Alle andere bloedverdunnende medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen.

Nuchter zijn

U mag vanaf drie uur voor aanvang van het onderzoek niets meer eten. U mag wel drinken en vloeibaar voedsel gebruiken zoals bouillon, vla of pap. Als u medicijnen slikt, mag u deze wel gewoon met wat water innemen.

Meenemen naar het ziekenhuis

We vragen u om het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:

- Een uitdraai van uw actuele medicijngebruik. Dit overzicht kunt u gratis bij uw apotheek opvragen.
- Uw medicijnkaart (als u deze heeft).
- Iets om te lezen voor na het onderzoek.
- Als u daar gebruik van maakt: uw insulinepen.

U hoeft *niet* mee te nemen:

- Pyjama. U krijgt een jasje aan van het ziekenhuis
- Eten en drinken. Dit krijgt u in het ziekenhuis.

Adviezen

- U krijgt na de behandeling waarschijnlijk een drukverband, waardoor u uw broek niet goed dicht kunt krijgen. Daarom raden we u aan om makkelijk zittende en wijde kleding te dragen.
- Ook raden we u aan om op de dag van de behandeling sieraden thuis te laten, deze kunnen dan ook niet kwijtraken in het ziekenhuis.

Vervoer

Na het onderzoek mag u zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

Zwangerschap

Bent u **zwanger**, of denkt het te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts. U hoort dan of uw behandeling kan doorgaan.

Opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling.

Ter voorbereiding op het onderzoek scheert de verpleegkundige uw liezen. Ook krijgt u een infuusnaaldje in uw arm.

Het onderzoek

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Opzoeken liesslagader

De arts die het onderzoek uitvoert is niet uw eigen arts, maar een interventieradioloog die gespecialiseerd is in dit soort behandelingen. De radioloog wordt geassisteerd door twee gespecialiseerde laboranten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U ligt op uw rug op de onderzoekstafel. We desinfecteren eerst uw huid en leggen daarna een steriel laken over u heen.

De interventieradioloog zoekt met echografie in uw lies de liesslagader op en prikt deze aan met een naald. Vervolgens plaatst hij een toegangsbuisje (een zogeheten sheath) in de slagader. Door dit buisje schuift hij een dunne katheter (een dun slangetje) in uw bloedbaan. Met de katheter zoekt hij de bloedvaten op die moeten worden afgebeeld.

Als de katheter op de juiste plek ligt, spuit hij contrastmiddel door de katheter. Er worden dan opnames gemaakt. Van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt al heel snel.

Aan het eind van het onderzoek worden de katheter en sheath verwijderd. De aangeprikte plaats wordt gedurende 10-15 minuten goed dichtgedrukt. Eventueel wordt er na het dichtdrukken van de aangeprikte plaats een drukverband aangelegd.

Het onderzoek duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U moet drie tot vijf uur plat blijven liggen. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, polsslag, temperatuur en het drukverband.

Het is belangrijk om na de behandeling extra veel te drinken. Zo plast u het contrastmiddel sneller uit.
Op de afdeling mag u alles weer eten en drinken.

Weer naar huis

Afhankelijk van het onderzoek kunt u een uur na de bedrust naar huis of blijft u nog een nachtje in het ziekenhuis. Het drukverband blijft tot de volgende dag zitten.

Na de behandeling mag u zelf geen voertuig besturen. Wij raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

We raden u aan om de eerste dagen na de behandeling rustig aan te doen. Vanaf de derde dag na de behandeling kunt u alle dagelijkse activiteiten weer hervatten.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor deze afspraak dit onderzoek, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 7 190? De opgevallene plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen van 09.00 -16.00 uur naar de afdeling Radiologie. We beantwoorden uw vragen graag.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2018
pavo 0158