

Arginine-test

Informatie voor ouders/verzorgers

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt bij uw kind een onderzoek gedaan naar de aanmaak van het groeihormoon. Dit onderzoek wordt de Arginine-test genoemd. De kinderarts heeft het onderzoek met u besproken. In deze folder leest u meer over de voorbereiding en over het onderzoek.

Uw kind heeft een afspraak voor de Arginine-test

Op: _____ dag _____ om _____ uur

Het onderzoek vindt plaats op de

- Kinderdagbehandeling locatie Zwijndrecht.
- Kinderafdeling (T1) locatie Dordwijk.

De Arginine-test

Het groeihormoon wordt door een klier in de hersenen, de hypofyse, aangemaakt. Als de aanmaak van het groeihormoon verstoord is, kan dit de groei van uw kind belemmeren. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een afwijking in de aanmaak van het groeihormoon, wordt een Arginine-test gedaan. Arginine is een eiwitachtige stof die de hypofyse tijdelijk aanzet tot het afgeven van extra groeihormoon. Via een infuus wordt de Arginine toegediend. Daarna wordt er een aantal keer bloed bij uw kind afgenomen via het ingebrachte infuusnaaldje. In het laboratorium kan vervolgens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed bepaald worden.

De Arginine-test duurt ongeveer drie uur. Uw kind wordt tijdens het onderzoek opgenomen op de kinderafdeling/kinderdagbehandeling.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Voor het onderzoek

Uw kind moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf 24.00 uur de avond voor de test niet meer mag eten. Uw kind mag wel wat slokjes water drinken.

U kunt eventueel iets meenemen om te doen voor uw kind, bijvoorbeeld een leesboek of speelgoed.

Kinderen tot één jaar

Als uw kind jonger is dan één jaar, dan mag u uw kind tot vier uur voor het onderzoek nog voeding geven.

De dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd melden u en uw kind zich op de Kinderafdeling van locatie Dordwijk of de kinderdagbehandeling van locatie Zwijndrecht.

De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de behandelkamer. Omdat er bloed afgenomen moet worden tijdens deze Arginine-test brengt de kinderarts of verpleegkundige een infuusnaaldje in.

Dit gebeurt meestal in de hand of de arm. Vooraf wordt er eventueel verdovende zalf (Emla) op de hand of arm aangebracht, zodat het prikken minder pijnlijk is. Hierbij is ter begeleiding en ondersteuning van uw kind de pedagogisch medewerkster aanwezig.

Tijdens het onderzoek wordt totaal vijf keer bloed afgenomen uit hetzelfde infuusnaaldje. Nadat de eerste keer bloed is afgenomen krijgt uw kind via het infuus Arginine toegediend. Het inlopen van de Arginine duurt ongeveer een half uur.

Tijdens het onderzoek moet uw kind op bed blijven. Dit is nodig omdat uw kind zich soms misselijk kan voelen, hoofdpijn kan hebben of een lage bloedsuiker kan krijgen. Daarom wordt tijdens de bloedafnames ook de bloedsuiker in het bloed bepaald.

Na afloop van de Arginine-test wordt het infuusnaaldje verwijderd. Pas nadat uw kind iets gegeten en gedronken heeft en zich goed voelt mag u uw kind weer mee naar huis nemen.

De uitslag

Het afgenomen bloed wordt in het laboratorium verder onderzocht. Als u en uw kind het ziekenhuis verlaten, wordt er in overleg met u een poliklinische of telefonische afspraak gemaakt bij de behandelend kinderarts. De kinderarts bespreekt dan met u de uitslag van de test.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust tijdens kantooruren contact op met Kinderdagbehandeling van locatie Zwijndrecht. Ook voor het maken of verzetten van de afspraak belt u naar tel. (078) 654 11 31.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2019
pavo 0445