

# Antroscopie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

Albert  
Schweitzer  
ziekenhuis



# Inleiding

De KNO-arts gaat bij u een antroscopie doen. Dit onderzoek en/of deze behandeling bestaat uit het bekijken van de kaakholttes via een endoscoop (= kijker). In deze folder leest u meer over de antroscopie.

## Wanneer is een antroscopie nodig?

Een antroscopie is nodig om te onderzoeken of u een ontsteking heeft in uw kaakholttes. Als u een kaakholtteontsteking heeft, dan is het mogelijk om tijdens de antroscopie de kaakholttes schoon te zuigen of te spoelen.

### Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt zoals aspirine-preparaten, Acenocoumarol of Marcoumar dan moet u in overleg met uw arts drie dagen voor het onderzoek stoppen met deze medicijnen. Na het onderzoek begint u weer met deze medicijnen.

### Verdoving

De antroscopie wordt meestal onder plaatselijke verdoving gedaan. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. De verdoving wordt gegeven via watjes die gedrenkt zijn in verdovingsvloeistof of met wattenstaafjes. Deze vloeistof moet even inwerken. Hierna krijgt u nog een prikje om extra te verdoven. Tijdens het verdoven loopt er altijd wat verdovingsvloeistof in uw keel. U kunt hierdoor een dik gevoel in uw keel krijgen en moeite hebben met slikken. Uw keel wordt dus niet echt dikker, het voelt alleen zo.

Na de antroscopie wacht u een uur voordat u weer wat mag eten en drinken.

# Het onderzoek

Zodra de verdoving is ingewerkt begint het onderzoek. Eerst wordt een dun buisje via uw neus naar uw kaakholte geschoven. Tijdens het inbrengen hoort u een krakend geluid, omdat het buisje door een dun botwandje wordt ingebracht. Dit herstelt zich later altijd. Door dit buisje kan de KNO-arts met een endoscoop in uw kaakholte kijken en deze zo nodig schoonzuigen en/of schoonspoelen.

Het is eventueel mogelijk om tijdens dit onderzoek wat weefsel uit de holtes of de neus te verwijderen voor onderzoek. De uitslag van het weefselonderzoek zal met u op een later tijdstip besproken worden. Hiervoor krijgt u een afspraak mee. Het is niet mogelijk om poliepen uit de holtes te verwijderen bij dit onderzoek. Mocht dit nodig zijn, dan wordt hiervoor een operatie afgesproken.

# Na het onderzoek

De verdoving is na ongeveer een uur uitgewerkt. De meeste patiënten hebben weinig tot geen napijn. Als u toch pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken volgens de dosering die in de bijsluiter staat. De eerste dagen na het onderzoek kan er nog wat bloed uit uw neus komen, samen met wat korstjes en slijm. Goed spoelen met zout water voorkomt korstvorming en zwelling. (zie folder 'spoelen met zout water'). Ook kan uw neus de eerste dagen nog wat verstopt zijn. Deze klachten verdwijnen na enkele dagen.

# Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:  
[www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
juli 2017  
pavo 0926