

Afsluiten van een slagader

Embolisatie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie


Inleiding

Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u een slagader zal worden afgesloten. Deze behandeling noemen we embolisatie. Als u niet opgenomen bent in het ziekenhuis, dan staat u inmiddels op de wachtlijst hiervoor. U wordt dan door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Embolisatie

Het afsluiten van een bloedvat kan nodig zijn, omdat er een bloeding in één van de slagaders is. Ook kan het zijn dat de bloedtoevoer naar een orgaan moet worden afgesloten, omdat er in dat orgaan een tumor groeit.

Het afsluiten van een slagader gebeurt met materiaal dat de bloedstroom tegenhoudt. Vaak zijn dat coils. Coils zijn kleine stukjes opgerold metaal draad met een doorsnede van enkele millimeters (zie afbeelding. 1).



Afbeelding 1: De coils zijn enkele millimeters groot

Vorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u de bloedverdunnende medicijnen Sintrommitis (aceno-coumarol), Marcoumar (fenprocoumon) of NOAC's (nieuwe orale anti coagulantia)? Dan moet u **in overleg met uw specialist** enkele dagen voor de behandeling stoppen met het innemen van deze medicijnen. Alle andere bloedverdunnende medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen.

Nuchter zijn

U mag vanaf drie uur voor aanvang van de behandeling niets meer eten. U mag wel drinken en vloeibaar voedsel gebruiken, zoals vla, pap of bouillon.

Als u medicijnen gebruikt, mag u deze zoals gebruikelijk innemen.

Meenemen naar het ziekenhuis

We vragen u om het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:

- Een uitdraai van uw actuele medicijngebruik. Dit overzicht kunt u gratis bij uw apotheek opvragen.
- Uw medicijnkaart (als u deze heeft).
- Iets om te lezen voor na het onderzoek.
- Als u daar gebruik van maakt: uw insulinepen.

U hoeft *niet* mee te nemen:

- Pyjama. U krijgt een schortje aan van het ziekenhuis
- Eten en drinken. Dit krijgt u in het ziekenhuis.

Adviezen

- U krijgt na de behandeling waarschijnlijk een drukverband, waardoor u uw broek niet goed dicht kunt krijgen. Daarom raden we u aan om makkelijk zittende en wijde kleding te dragen.

- Ook raden we u aan om op de dag van de behandeling sieraden thuis te laten. Deze kunnen dan ook niet kwijtraken in het ziekenhuis.

Vervoer

Na het onderzoek mag u zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

Zwangerschap

Als u **zwanger** bent of denkt het te zijn, wilt u dan contact opnemen met uw behandelend arts? U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling.

Als voorbereiding op het onderzoek scheert de verpleegkundige uw liezen. Ook krijgt u een infuusnaaldje in uw arm.

De behandeling

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Opzoeken liesslagader

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het operatiecomplex van de locatie Dordwijk.

De arts die de behandeling uitvoert is niet uw eigen arts, maar een interventie-radioloog die gespecialiseerd is in deze behandelingen. De radioloog wordt geassisteerd door twee gespecialiseerd laboranten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U ligt op uw rug op de onderzoekstafel. We desinfecteren eerst uw huid en leggen daarna een steriel laken over u heen.

De interventieradioloog zoekt met echografie in uw lies de liesslagader op en prikt deze aan met een naald. Vervolgens plaatst hij een toegangsbuisje (een zogeheten sheath) in de slagader.

Door dit buisje schuift hij een dunne katheter (een dun slangetje) in uw bloedbaan. Met de katheter zoekt hij de slagader op die geëmboliseerd moet worden.

Als de katheter op de juiste plek ligt, spuit hij contrastmiddel door de katheter. Er worden dan opnames gemaakt. Van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt al heel snel.

Plaatsen van de coils

Nadat de opnames gemaakt zijn gaat de interventieradioloog over tot het plaatsen van de coils in het bloedvat. Vaak zijn er meerdere coils nodig om tot een volledige afsluiting van de slagader te komen. Met röntgendoorlichting wordt het plaatsen van de coils nauwkeurig in de gaten gehouden.

Als er een volledige afsluiting van de slagader is bereikt worden de katheter en de sheath verwijderd. Er wordt eventueel een drukverband aangelegd. De coils blijven in de slagader achter. Hier merkt u niks van.

De behandeling duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Dit is per patiënt verschillend en is moeilijk van tevoren aan te geven.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U moet drie tot vijf uur plat blijven liggen. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, polsslag, temperatuur en het drukverband.

Het is belangrijk om na de behandeling extra veel te drinken. Zo plast u het contrastmiddel sneller uit.

Eten en drinken

Op de afdeling mag u alles weer eten en drinken.

Weer naar huis

Afhankelijk van de behandeling kunt u een uur na de bedrust naar huis of blijft u nog een nachtje in het ziekenhuis. Het drukverband blijft tot de volgende dag zitten.

Na de behandeling mag u zelf geen voertuig besturen. Wij raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

We raden u aan om de eerste dagen na de behandeling rustig aan te doen. Vanaf de derde dag na de behandeling kunt u alle dagelijkse activiteiten weer hervatten.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor deze behandeling, wilt u dit dan zo snel mogelijk telefonisch doorgeven aan de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen van 09.00 -16.00 uur naar de afdeling Radiologie. Onze medewerker verbindt u door met iemand die uw vragen kan beantwoorden.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2018
pavo 0987