

Flaporen

Behandeling door de plastisch chirurg

Belangrijk

Komt u als patiënt in ons ziekenhuis, dan stellen we u de volgende vragen:

1. a Bent u besmet met MRSA of een andere BRMO (=ziekenhuisbacterie)?
b Is uw partner/huisgenoot of iemand die u verzorgt, besmet met MRSA?
2. Bent u afgelopen jaar opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling en/of bent u woonachtig geweest in een opvanglocatie voor asielzoekers?
3. Bent u afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere binnenlandse zorginstelling (m.u.v. Albert Schweitzer ziekenhuis) met een MRSA-/BRMO-probleem?
4. Komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
5. Voor jongeren onder de 18 jaar: ben je afgelopen jaar geadopteerd uit het buitenland?
Dat doen we om het risico op besmetting met resistente* bacteriën uit te sluiten. Zo maken we onze zorg nog veiliger.

*Resistent = ongevoelig voor antibiotica

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis



Inleiding

Flaporen of afstaande oren komen regelmatig en worden veroorzaakt door een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De plastisch chirurg kan dit corrigeren.

Een flapoorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer zeven jaar.

Vorbereiding op de operatie

Het is belangrijk dat u vóór uw operatie een haarband koopt. Een haarband (of sportband/zweetband) kunt u in veel gevallen bij een sportwinkel vinden. De haarband is nodig om de oren te beschermen nadat het verband verwijderd is. Meer hierover leest u onder het kopje 'Na de operatie'.

Wij adviseren de haarband te kopen vóór de operatie, zodat u deze kunt passen. Na de operatie heeft u namelijk verband om uw oren.

Plaatselijke verdoving of narcose

Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving of onder narcose worden uitgevoerd. Dit hangt af van uw leeftijd en/of voorkeur. De plastisch chirurg bespreekt dit vooraf met u.

- Als de ingreep poliklinisch **onder plaatselijke verdoving** wordt gedaan, verblijft u minimaal twee uur op onze polikliniek.
- Als u **onder narcose** wordt geopereerd, wordt u een dagje opgenomen in het ziekenhuis. U mag u dezelfde dag weer naar huis. U krijgt dan voor uw operatie nog wel een gesprek met de anesthesioloog en de intakeverpleegkundige. De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

De operatie

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van uw oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht en eventueel met een blijvende hechting vast gezet. Het stukje huid dat aan de achterkant van uw oor overblijft (doordat het oor dichtert tegen uw hoofd komt), wordt verwijderd.

Weer naar huis

- Na de operatie krijgt u een strak verband om uw hoofd, de zogenoemde tulband. Dit verband moet gemiddeld een week blijven zitten. U mag dit verband **niet verschuiven of losmaken**.
- Als u pijn heeft, mag u pijnstillers innemen zoals paracetamol.
- Ook overdag moet u **voorzichtig** zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.
- U mag uw haar pas wassen als het verband verwijderd is.
- Gemiddeld mag u de eerste vier weken na de operatie niet sporten en zwemmen. Dit hangt af van de wondgenezing.

Controle

De week na uw operatie komt u voor controle terug bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Zij verwijdert het verband, controleert de wond en verwijdert zo nodig de hechtingen.

Haarband meenemen

De haarband die u voor de operatie heeft gekocht, neemt u mee naar uw afspraak met de verpleegkundige. Zodra het verband is verwijderd, wordt de haarband omgedaan om uw oren te beschermen.

Hoe lang draagt u de haarband?

De plastisch chirurg spreekt met u af hoe lang de haarband moet dragen.

- Of u draagt uw haarband twee weken dag en nacht. In de derde en vierde week draagt u de haarband alleen 's nachts.
- Of u draagt uw haarband zes maanden alleen 's nachts. Als u aan contactsporten doet, is die periode maximaal één jaar.

Kinderen tot zestien jaar moeten de haarband gedurende zes weken dag en nacht dragen, daarna zes maanden alleen 's nachts en maximaal één jaar als zij aan contactsporten doen.

Een arts waarschuwen

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

- Als de wond fors gaat bloeden
- Bij toenemende pijn
- Bij optreden van abnormale zwelling
- Als u koorts heeft boven de 38,5°C of koude rillingen
- Als het verband extreem gaat jeuken, gaat ruiken of uitslag veroorzaakt
- Bij ongerustheid

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastische chirurg.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie.

Door de stugheid van het kraakbeen, heeft het in sommige gevallen de neiging om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat uw oren geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit worden gegarandeerd. Een enkele keer is het nodig om nog een aanvullende correctie uit te voeren.

Het eerste jaar na de operatie zullen uw oren extra gevoelig zijn bij koud weer. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer.

Risico's en complicaties

Bij elke operatie kunnen complicaties voor komen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing of infectie.

Na de operatie komt er een litteken achter uw oor. Er bestaat een risico op hypertroof (overmatig) littekenweefsel. Hierdoor kan een aanvullende behandeling nodig zijn.

Vergoeding

De kosten voor een correctie aan uw oren worden alleen vergoed als er sprake is van een medische indicatie en uw verzekering deze kosten vergoed. De verzekeraars hebben verschillende criteria voor de medische indicatie. U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed.

Als de plastisch chirurg vindt dat er een medische indicatie voor de correctie is, zal de aanvraag bij uw verzekering worden gedaan. Na gemiddeld drie à vier weken krijgt u de goedkeuring of afwijzing thuisgestuurd.

Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Tot slot

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66. We beantwoorden uw vragen graag.

Tip:

Het is handig voor uzelf om deze folder mee te nemen wanneer u wordt behandeld. U kunt dan alle relevante informatie nog eens nalezen.



Nederlandse Vereniging
voor Plastische Chirurgie

HANDCHIRURGIE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE CHIRURGIE

Verantwoording tekst

De informatie is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie; Patientefolders - Flaporen

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2016
pavo 0723