

Blaasfunctie- onderzoek

door de gynaecoloog

informatie

Albert Schweitzer ziekenhuis
Locatie Zwijndrecht
januari 2012
pavo 0195



Inleiding

U hebt een afspraak voor een blaasfunctieonderzoek

op _____ dag _____ om _____ uur.

Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek gynaecologie van locatie Zwijndrecht.

In deze folder willen wij u informeren over dit onderzoek.

Een blaasfunctieonderzoek

Een blaasfunctieonderzoek wordt ook wel urodynamisch onderzoek genoemd (UDO). Dit onderzoek wordt gedaan als u last heeft van ongewild urineverlies of als u kunt niet (goed) kunt uitplassen.

Tijdens het onderzoek wordt de druk in uw blaas en uw plasbuis gemeten samen met de druk in uw buikholte. Ook wordt de kracht van uw urinestraal bepaald.

Soms wordt ook de spierspanning van de bekkenbodemspieren gemeten.

Het onderzoek is niet pijnlijk.

De voorbereiding

Voor dit onderzoek is thuis geen voorbereiding nodig. **Wel moet u met een volle blaas naar het ziekenhuis komen.**

In het ziekenhuis meldt u zich bij de polikliniek gynaecologie.

De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte waar u de kleding van het onderlichaam uittrekt. De kleding van het bovenlichaam kunt u aan houden.

informatie

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel met uw benen in beensteunen. Vlak voor het onderzoek doet de gynaecoloog bij u een vaginaal onderzoek. Daarna wordt het blaasfunctieonderzoek gedaan door een verpleegkundige.

U wordt gevraagd liggend uit te plassen. Vervolgens brengt de verpleegkundige een dun slangetje via uw plasbuis in uw blaas. Door dit slangetje wordt de blaas met een vloeistof gevuld. Het slangetje dient tevens voor de drukmeting in de blaas. Tegelijkertijd wordt een soort ballonnetje in uw endeldarm gebracht, waarmee de druk in de buikholte wordt gemeten.

U geeft tijdens het onderzoek aan wanneer u de eerste aandrang tot plassen voelt. Regelmatig wordt u gevraagd om te hoesten. Dit is om te zien of er urineverlies optreedt. Alle bevindingen worden door de computer waargenomen en geregistreerd.

Aan het einde van het onderzoek wordt u gevraagd om de hoeveelheid vloeistof die via het slangetje is ingebracht, weer uit te plassen. Hiervoor is een speciaal apparaat aanwezig waarin de urinestraal wordt opgevangen en waarmee tegelijkertijd de kracht van de straal wordt gemeten.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

informatie

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een computer-uitdraai mee met daarop de resultaten van het onderzoek.

Vervolgens gaat u naar de polikliniek gynaecologie, waar de gynaecoloog met u de uitslag van het onderzoek bespreekt.

Hierna kunt u weer naar huis. U kunt zelf autorijden of gebruik maken van het openbaar vervoer.

De eerste uren na het onderzoek zult u mogelijk vaker moeten plassen. Deze klacht verdwijnt vanzelf.

Als u last krijgt van voortdurende aandrang tot plassen en/of u moet telkens kleine beetje plassen, dan raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts of gynaecoloog.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten aan de polikliniek gynaecologie. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Gynaecologie, tel. (078) 654 64 46.

informatie