

Testarea pentru MRSA, C.auris și alte BRMO

Roemeens

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Introducere

Ați primit un pachet pentru testarea MRSA (Stafilococul Auriu Meticilino-Rezistent), *Candidozyma auris* (*C. auris*) și BRMO (Microorganisme Deosebit de Rezistente Acest test poate determina dacă sunteți purtător al uneia dintre aceste bacterii.

În această broșură puteți citi mai multe despre aceste bacterii, despre factorii de risc de transmitere, despre măsurile de izolare și colectarea, despre rezultatul și înregistrarea testului.

MRSA, *C. auris* și BRMO

MRSA este un microorganism deosebit de rezistent, care seamănă foarte mult cu bacteriile uzuale ale pielii. Pe lângă MRSA, există și alte microorganisme deosebit de rezistente. Pentru aceasta folosim abrevierea BRMO. Adesea, acestea sunt foarte asemănătoare cu bacteriile care apar în mod natural în intestinalele tuturor persoanelor.

Infecțiile cu bacteria "uzuală" a pielii și cu și cu bacteriile intestinale pot fi, de obicei, tratate bine cu majoritatea antibioticelor. Antibioticele sunt medicamente careucid bacteriile. Cu toate acestea,, MRSAC. Auris și BRMO au devenit insensibile la majoritatea antibioticelor. Din acest motiv infecțiile cu aceste bacterii sunt mai dificil de tratat.

Consecințele pentru pacient și spital

Majoritatea persoanelor care contractă MRSA *C. auris* sau BRMO nu prezintă niciun simptom. Dacă nu există simptome, persoana este numit „purtător”. În calitate de purtător, puteți transmite bacteria altor

persoane. În spital, aceste bacterii pot cauza probleme grave. La spital sunt mulți oameni împreună, ceea ce crește riscul de răspândire.

De aceea, fiecare spital din Olanda acordă o atenție deosebită prevenirii răspândirii acestor bacterii. Printre altele, acest lucru este făcut prin examinarea pacienților care sunt suspectați că ar putea fi purtători de MRSA C.auris sau alt BRMO, prin testarea pentru verificarea prezenței acestor bacterii.

Factorii de risc pentru transmitere

S-ar putea să fiți purtător dacă:

- Ați fost recent tratat sau internat într-un spital din străinătate sau într-un azil de bătrâni.
- Ați fost internat în ultimul an într-un spital din Olanda sau într-un azil de bătrâni unde predomină MRSA C. auris sau BRMO.
- Partenerul/colocatarul dvs. sau cineva de care aveți grijă este purtător de MRSA C. auris sau BRMO.
- Urmare a profesiei dvs. sau locuiți la o fermă unde intrați în contact cu porci vii, viței sau pui de carne.
- Locuiți într-un centru de primire pentru solicitanți de azil.
- Ai sub 18 ani și ai fost adoptat din străinătate.

Măsurile de izolare

Dacă se suspectează că sunteți purtător, în cazul unei internări în spital (tratament de o zi, dializă) sau vizitării Serviciului de Urgență (izolare strictă), sunt necesare măsuri de izolare de cel mult 24 de ore. Această măsură de izolare va fi ridicată dacă, în urma testării a rezultat că nu sunteți infectat cu MRSA C. auris și BRMO.

Nu sunt necesare măsuri de izolare atunci când vizitați ambulatoriul. Măsurile de izolare sunt:

- Veți fi îngrijit într-o cameră de izolare. Aceasta este o cameră single cu antecameră (spațiu intermediar).
- Nu aveți voie să părăsiți camera decât pentru testare sau tratament.
- Ușa camerei dvs. este ținută pe cât posibil închisă.
- Personalul spitalului și vizitatorii care vin în camera dumneavoastră poartă îmbrăcăminte de protecție.
- Dacă trebuie să părăsiți camera sau secția, trebuie să purtați mască gura-nas. Veți primi această mască de la asistente.
- Familia dvs. poate duce rufele acasă. Acestea ar trebui puse din camera dvs. într-o pungă de plastic. În antecameră, această pungă trebuie introdusă într-o a doua pungă de plastic.

Testarea pentru MRSA C.auris și alte BRMO

Pentru a determina dacă sunteți purtător de MRSA C. auris sau alt BRMO, trebuie să treceți printr-o examinare. Puteți citi ce trebuie să faceți în explicația pe care o primiți în acest pachet. Dacă nu reușiți să faceți singur acest lucru, vă puteți adresa medicului dvs. de familie.

Rezultatul și înregistrarea

Dacă testul indică faptul că sunteți purtător de MRSA C.auris sau BRMO, medicul dvs. vă va informa în cel mai scurt timp posibil. Medicul dvs. vă va explica dacă este necesar tratamentul. De asemenea, medicul dvs. va fi informat despre acest lucru.

De asemenea, vom introduce o notificare în dosarul dvs. de pacient că sunteți purtător.

Această notificare are scopul ca la următoarea dvs. vizită la spitalul Albert Schweitzer, să fie vizibil că aveți MRSA C.auris sau BRMO. Dacă este necesar, se vor lua măsuri de izolare.

Transmiterea și tratamentul

Dacă sunteți purtător de MRSA, puteți fi tratat cu antibiotice. Medicul dvs. curant va decide dacă acest lucru este necesar.

Dacă sunteți purtător de de C.auris sau BRMO, nu veți fi tratat cu antibiotice. Până acum acest lucru nu pare să fie util.

Pe lângă faptul că sunt purtător, persoanele cu rezistență redusă se pot infecta și cu MRSA C.auris sau BRMO. Infecțiile sunt de obicei tratate cu antibiotice.

În final

Aveți întrebări după ce ați citit Broșura? Vă rugăm să sunați cu încredere la secția de Prevenire a infecțiilor, tel. (078) 654 50 00. Vă răspundem cu drag întrebărilor.

Exprimați-vă părerea cu privire la această broșură:

www.asz.nl/foldertest/

Spitalul Albert Schweitzer
ianuarie 2026
pavo 1872