

Onderzoek naar MRSA en andere BRMO

Arabisch

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

مقدمة

تلقيت حزمة من أجل فحص بخصوص MRSA (المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين) و BRMO (الكائنات الدقيقة المقاومة). يمكن عن طريق هذا الفحص تحديد ما إن كنت حاملا لإحدى أنواع هذه البكتيريا.

تقرأ في هذا المنشور المزيد حول هذه البكتيريا وعوامل الخطورة لحملها وإجراءات العزل وإجراء الفحص ونتيجة الفحص وتسجيله.

MRSA و BRMO

MRSA هي نوع استثنائي مقاوم من الكائنات الدقيقة التي تشبه كثيرا بكتيريا الجلد العادية (المكورات العنقودية الذهبية). هناك إلى جانب MRSA كذلك كائنات دقيقة استثنائية مقاومة أخرى. ونستخدم لها المختصر BRMO. وهي تكون غالبا بكتيريا تشبه كثيرا البكتيريا الموجودة طبيعيا لدى كل شخص في الأمعاء. يمكن علاج عدوى المكورات العنقودية الذهبية "الطبيعية" وبكتيريا الأمعاء غالبا بأغلب المضادات الحيوية بشكل جيد. المضادات الحيوية هي أدوية تقتل البكتيريا. لكن MRSA و BRMO قد أصبحت غير حساسة لأغلب المضادات الحيوية. يصعب بسبب ذلك علاج العدوى بهذه البكتيريا.

العواقب بالنسبة للمرضى والمستشفى

لا توجد شكاوى لدى أغلب الأشخاص المصابين ب MRSA و BRMO. عندما لا توجد شكاوى، يسمى الشخص "حاملا". لكن يمكنك كحامل نقل البكتيريا إلى الأشخاص الآخرين. يمكن أن تسبب هذه البكتيريا مشاكل كبيرة في المستشفى. هناك أشخاص كثيرين بالقرب من بعضهم في المستشفى، مما يجعل نسبة الانتشار أكبر. لذلك تخصص كل مستشفى في هولندا انتباها خاصا لمنع انتشار هذه البكتيريا. نقوم بذلك عن طريق مما ضمنه فحص المرضى الذين هناك شك بأنهم ربما يكونون حاملين لـ MRSA أو BRMO أخرى بخصوص وجود هذه البكتيريا.

عوامل الخطورة للحمل

يمكنك أن تكون حاملا إذا:

- تم علاجك أو إدخالك حديثا في مستشفى أو دار ترميض في الخارج.
- تم إدخالك في السنة الماضية إلى مستشفى أو دار ترميض هولندي كانت MRSA أو BRMO منتشرة فيه.
- كان شريك حياتك/زوجك أو شخص ترعاه حاملا لـ MRSA أو BRMO.
- كان لديك احتكاك مهني بالخنازير الحية أو عجول اللحم أو فروج اللحم أو كنت تسكن في شركة تتم فيها تربية هذه الحيوانات.
- كنت تسكن في موقع إيواء للاجئين.
- كنت بسن أصغر من 18 سنة وتم تبنيك من الخارج

إجراءات العزل

- عند وجود شك في حمل البكتيريا في حالة الإدخال إلى المستشفى لمدة أقصر من 24 ساعة (علاج نهارى، غسيل كلية) وفي حالة زيارة المساعدة الطارئة، فهناك إجراءات عزل ضرورية (عزل صارم). يتم رفع إجراءات العزل هذه إن لم يثبت من الفحص وجود MRSA و BRMO. لا حاجة لإجراءات عزل في حالة زيارة العيادة الخارجية. إجراءات العزل هي:
- يتم ترميضك في غرفة عزل. وهي غرفة مخصصة لشخص واحد مع (مكان انتقالي).
 - لا يسمح لك بمغادرة الغرفة، إلا في حالة الفحص أو العلاج.
 - يكون باب غرفتك مغلقا بقدر الإمكان.
 - يرتدي موظفو المستشفى والزائرين الذين يدخلون غرفتك ملابس واقية.
 - إذا كان عليك مغادرة غرفتك، يجب عليك ارتداء كمامة فم وأنف. يمنحك الترميض هذه الكمامة.
 - يمكن لأفراد العائلة اخذ ملابس الغسيل الخاصة بك إلى المنزل. ويجب عليهم وضع ملابس الغسيل في كيس بلاستيكي في غرفتك. يجب وضع الكيس في كيس بلاستيكي آخر في المكان الانتقالي لغرفة العزل.

الفحص بخصوص MRSA وBRMO

لغرض فحص إن كنت حاملا لـ MRSA أو BRMO أخرى، يجب إجراء فحص لك. تقرأ في الشرح الذي تحصل عليه مع الحزمة ما يجب عليك عمله. إذا لم تتمكن من عمل ذلك بنفسك، يمكنك سؤال طبيب العائلة الخاص بك.

النتيجة والتسجيل

إذا اتضح من الفحص أنك حامل لـ MRSA أو BRMO، يتم إبلاغك بأسرع ما يمكن بذلك من قبل طبيبك المعالج. يوضح طبيبك ما هو ضروري من أجل العلاج. يتم إبلاغ طبيب العائلة الخاص بك بذلك أيضا.

كما نضع بلاغا بذلك في ملف المريض الإلكتروني الخاص بك بأنك حامل للبكتيريا. عن طريق هذا البلاغ، يكون واضحا أثناء زيارتك القادمة لمستشفى اليرت شوايتزر أنك حامل لـ MRSA أو BRMO. يتم بذلك اتخاذ إجراءات العزل عند الضرورة.

الحمل ولعلاج

إذا كنت حاملا لـ MRSA، يمكن علاجك باستخدام المضادات الحيوية. يتخذ طبيبك المعالج القرار حول ضرورة ذلك.

إذا كنت حاملا لـ BRMO، لا يتم علاجك باستخدام المضادات الحيوية. حيث اتضح لغاية الآن بأن ذلك غير مفيد.

يمكن بالنسبة للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة إلى جانب حمل البكتيريا أن يصابوا بعدوى MRSA أو BRMO. يتم في الغالب علاج العدوى بواسطة المضادات الحيوية.

في الختام

هل لديك أسئلة بعد قراءة المنشور؟ لا تتردد في الاتصال هاتفيا بقسم منع العدوى، هاتف 0786545000. نجيب أسئلتك بكل سرور.

امنح رأيك حول هذا المنشور هنا: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 1869