

Besnijdenis

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**


Inleiding

Binnenkort wordt bij u of bij uw zoon een besnijdenis (circumcisie) verricht. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie, de operatie en de nazorg. De operatie wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis door de uroloog of door de chirurg gedaan.

Een besnijdenis

Meestal vindt een besnijdenis plaats omdat de voorhuid van de penis te nauw is. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen problemen hebben met het plassen. Ook kan er een ontsteking van de eikel of voorhuid ontstaan. Bij volwassenen kan een vernauwde voorhuid pijn veroorzaken tijdens een erectie en geslachts-gemeenschap. Een besnijdenis op basis van geloofsovertuiging mag in het ziekenhuis niet meer worden uitgevoerd.

Bij een besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd (zie afbeelding 1). Uw arts heeft dit met u besproken.



Afbeelding 1: De voorhuid wordt geheel of gedeeltelijk verwijderd ().*

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vergoeding

Deze operatie wordt vanuit de basisverzekering op medische indicatie vergoed. Wilt u het zeker weten, neemt u dan contact op met uw zorgverzekering.

Als u informatie wilt over de kosten van de behandeling, kunt u bellen naar de Verrichtingenadministratie, tel. (078) 654 15 03 of een mail sturen naar watkosthet@asz.nl. Meer informatie vindt u ook op onze website www.asz.nl bij 'Zorgkosten en verzekeringen'.

De voorbereiding voor opname

Datum van de operatie

Een medewerker van OK-planning belt u om de datum van de operatie af te spreken. U hoort dan ook op welke afdeling u opgenomen wordt.

Eén werkdag voor de operatie

U belt één werkdag voor de operatie tussen 15.00 - 16.00 uur naar de afdeling waar u opgenomen wordt. U hoort dan het tijdstip van uw opname. Als u op maandag geopereerd wordt, dan belt u de vrijdag ervoor.

Volwassenen

Bij volwassenen vindt de operatie over het algemeen onder plaatselijke verdoving plaats.

Wanneer u zich goed voelt kan u na de ingreep direct het ziekenhuis weer verlaten. Regel wel iemand die u brengt en haalt.

Vervoer regelen

Als u tijdens de behandeling een roesje krijgt, mag u na de behandeling niet zelf aan het verkeer deelnemen, ook in verband met wettelijke regels (Wegenverkeerswet artikel 8.1). Regel u daarom vooraf vervoer naar huis.

Kinderen tot 18 jaar

De operatie bij kinderen vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) op de operatiekamer. Uw zoon moet daarom voor de operatie nuchter zijn. De regels over nuchter zijn leest u in de folder 'Anesthesie en pre-operatieve screening bij kinderen'.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u of uw zoon bloedverdunnende medicijnen? Dan bespreekt de arts met u hoeveel dagen voor de operatie er tijdelijk gestopt moet worden met deze medicijnen.

Als de arts dit niet met u heeft besproken, belt u dan met de polikliniek om dit aan te geven. Tijdens de opname bespreekt de arts wanneer deze medicijnen weer ingenomen mogen worden.

De operatie

De penis wordt gedesinfecteerd en de schaamstreek wordt met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid (gedeeltelijk) verwijderd. Rondom de basis van de eikel worden oplosbare hechtingen geplaatst. De operatie duurt ongeveer 40 minuten.

Na de operatie

De penis is meestal verbonden met een vettig gaas of zalf en soms ook met een drukverband. We adviseren u om het gaas/verband van de operatie zo mogelijk tot de volgende dag te laten zitten. Mocht het er eerder af vallen dan is dit niet erg. Daarna in principe geen vet gaas meer gebruiken, maar er vaseline zalf op smeren. De vaseline kunt u twee keer per dag aanbrengen op de eikel en de wond gedurende een week. Deze zalf kunt u voor de ingreep halen bij de drogist. Omdat de voorhuid (gedeeltelijk) is verwijderd, is de eikel na de ingreep (deels) onbedekt. De eerste weken kan de eikel gevoelig zijn.

Tijdens de operatie zijn mogelijk aanwezige verklevingen tussen uw voorhuid en de eikel losgemaakt. De eikel kan hierdoor een paar dagen rood en gezwollen zijn. Ook kunnen korstjes op de eikel ontstaan. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Nazorg

Volwassenen

- Na de operatie is het verstandig de rest van de dag rustig aan te doen. In verband met de verdoving die u heeft gekregen, is het niet toegestaan de eerste 24 uur na de operatie zelf een voertuig te besturen (zie kopje 'vervoer regelen').
- Het kan zijn dat u, wanneer u voor het eerst plast, wat bloed bij de urine heeft. Dat is niet erg.
- We adviseren u om het vette gaas/verband van de operatie zo mogelijk tot de volgende dag te laten zitten. Daarna in principe geen vet gaas meer gebruiken, maar de vaseline zalf erop te smeren.

- De dag na de operatie moet u één keer per dag douchen. We adviseren u de eikel schoon te houden door voorzichtig te spoelen. Hierdoor voorkomt u infectie rondom de hechtingen en het wondgebied. Gebruik bij het wassen en douchen géén zeep. Na het douchen of baden dekt u de wond droog.
- Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen losse boxershorts).
- Na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel houden in de penis. U kunt paracetamol tabletten innemen bij pijn.
- U kunt enkele dagen een branderig gevoel hebben bij het plassen. U kunt de eikel insmeren met een beetje vaseline. Het plassen voelt dan meestal minder branderig aan. Probeer ook goed te blijven drinken.
- Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. De korstjes kunnen gaan schrijnen.
- We raden u aan om twee weken niet te laten sporten, in bad te gaan of te zwemmen.

Kinderen

- Na de operatie kan uw zoon misselijk zijn. Zodra hij goed wakker is mag hij weer drinken. Gaat het drinken goed en is uw zoon niet misselijk dan mag hij weer alles eten en wordt het infuusnaaldje verwijderd.
- Het kan zijn dat uw zoon, wanneer hij voor het eerst plast, wat bloed bij de urine heeft. Dat is niet erg. Wanneer uw zoon geplast heeft en zich goed voelt kan hij naar huis.
- We adviseren u om het vette gaas van de operatie zo mogelijk tot de volgende dag te laten zitten. Daarna in principe geen vet gaas meer gebruiken, maar de vaseline zalf erop te smeren.
- De dag na de operatie moet uw zoon één keer per dag douchen. We adviseren u de eikel van uw zoon schoon te houden door voorzichtig te spoelen.

Hierdoor voorkomt u infectie rondom de hechtingen en het wondgebied. Gebruik bij het wassen en douchen géén zeep.

- Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen losse boxershorts).
- Uw zoon kan de eerste dagen moeite hebben met lopen doordat hij pijn aan de penis heeft. Bij pijn mag u uw zoon een paracetamol tablet of zetpil geven in de op de verpakking aangegeven dosering.
- Wij raden u aan om uw zoon gedurende twee weken niet te laten sporten, in bad te gaan of te laten zwemmen.

U krijgt een belafspraak mee. De verpleegkundige belt u op om te vragen hoe het met u of met uw zoon gaat. Als u nog vragen heeft over bijvoorbeeld de nazorg, kunt u deze stellen.

Mogelijke complicaties

Bij deze operatie zijn de volgende complicaties mogelijk:

- Er kan een nabloeding optreden. Een nabloeding uit zich in een bloederig verband of een bloeditstorting onder een hechting.
- Soms treedt er een infectie op.

Een arts waarschuwen

U waarschuwt uw arts als u of uw zoon last krijgt van onderstaande klachten:

- Een nabloeding die niet stopt nadat de penis vijftien minuten stevig is vastgehouden.
- Toenemende pijnklachten.
- Er komt pus uit de wond.
- De penis wordt dikker.
- Koorts boven de 38,5°C.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur belt u met de polikliniek:

- Chirurgie, tel. (078) 652 32 50.
- Urologie, tel. (078) 652 32 80.

Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. We zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

- Polikliniek Chirurgie (078) 652 32 50.
- Polikliniek Urologie (078) 652 32 80.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak belt u naar de polikliniek.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeelding op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
september 2024
pavo 0109