

Dupilumab

Medicijn bij eosinofiel astma

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw longarts heeft u het medicijn dupilumab voorgeschreven. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig eosinofiel astma. Behandeling met dupilumab kan worden voorgeschreven als u ondanks een hoge dosering ontstekingsremmers en luchtwegverwijders, nog steeds veel klachten heeft.

In deze folder leggen we u het doel en de werking van het medicijn uit. Daarnaast zetten we een aantal praktische zaken op een rij rond de behandeling met dupilumab, zoals de proefperiode, het zelf thuis injecteren en het herkennen van allergische reacties.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wat is dupilumab?

Het doel van de behandeling met dupilumab is om de klachten van uw eosinofiel astma beter onder controle te krijgen. Om te begrijpen waarom de dupilumab deze verbetering kan geven, volgt hier een korte uitleg over het medicijn.

Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij deze ontstekingsreactie zijn er verschillende soorten ontstekingscellen (witte bloedcellen) betrokken, waaronder zogeheten eosinofielen.

Eosinofiel astma is een vorm van astma dat niet goed reageert op gebruikelijke puffers. Dat komt doordat er te veel eosinofielen in de luchtwegen zitten.

Dupilumab is een medicijn dat er juist voor zorgt dat de eosinofielen worden geremd, waardoor uw astmaklachten kunnen verminderen.

Hoe wordt dupilumab gegeven?

Dupilumab wordt als een injectie gegeven, direct onder de huid meestal in uw bovenbeen of in uw buikplooï.

Bij de start van de behandeling krijgt u twee dezelfde injecties. Daarna krijgt u iedere 2 weken één injectie.

De injectie wordt toegediend met een kant en klare spuit, ook wel een pen genoemd. De pen is eenvoudig in het gebruik en speciaal gemaakt om het medicijn zelf te kunnen injecteren. Vanaf de eerste keer vertelt de verpleegkundige u hoe de pen werkt en mag u het later ook zelf doen. Verderop in de folder leest u hier meer over.

Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dupilumab bijwerkingen veroorzaken.

- De meest voorkomende bijwerking is hoofdpijn. Als u wilt kunt u hiervoor paracetamol innemen.
- Op de plaats van de injectie kan zwelling, pijn of roodheid optreden. Dit verdwijnt weer na enkele dagen.
- Daarnaast kan iemand allergisch reageren op het medicijn dupilumab.

Hoewel dit zelden voorkomt, is dit de reden dat u de injectie eerste drie maanden de op de afdeling Dagbehandeling krijgt. Zo kunnen we goed in de gaten houden of u allergisch reageert.

Bloedafname

Voorafgaand aan de 2e, de 3e, de 4e en de 6e injectie gaat u bloed laten prikken. Hierbij worden uw leverfuncties en de eosinofielen gecontroleerd. U krijgt de bloedafnameformulieren mee op de polikliniek of ze worden opgestuurd. Wilt u 5 tot 3 dagen voor de injectie bloed laten prikken? Dan is de uitslag voor de volgende injectie bekend.

Heel soms geeft dupilumab leverfunctiestoornissen. Heel soms gaat het lichaam na de dupilumab als reactie eosinofielen produceren. Uw behandelaar controleert de waarden in het bloed. Bij afwijkingen in de bloeduitslagen wordt u door de polikliniek gebeld.

Start behandeling

Proefperiode van 3 maanden

Het medicijn dupilumab wordt de eerste drie keer op de afdeling Dagbehandeling gegeven, daarna kunt u zelf thuis injecteren. Na 3 maanden is de proefperiode voorbij. Na deze periode heeft u opnieuw een afspraak bij uw longarts of bij de verpleegkundig specialist.

Dagbehandeling

Voor het toedienen van de injecties dupilumab wordt u telkens 2-3 uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling, locatie Zwijndrecht. Voor deze opnames krijgt u afspraken mee. De afspraken maken we in overleg met u. Het is belangrijk dat u deze afspraken **niet** verzet, zodat we goed kunnen onderzoeken hoe uw lichaam op dit medicijn reageert.

Er zijn geen voorbereidingen nodig voor deze behandeling. Ook na de behandeling hoeft u nergens rekening mee te houden en mag u autorijden.

Om het effect van de behandeling te meten, vragen we u bij iedere opname een vragenlijst over uw astmaklachten in te vullen.

Starterspakket

U krijgt van de verpleegkundige al bij de eerste keer van het toedienen van de injectie dupilumab een starterspakket mee. Zo kunt u thuis de informatie nog eens rustig nalezen. Bij het starterspakket zit ook een coolpack.

De tweede en de derde keer dat u voor uw injectie dupilumab komt op de afdeling Dagbehandeling, mag u zelf de injectie toedienen. De verpleegkundige legt uit hoe het injecteren gaat en helpt u daarbij. Gaat het goed? Dan kunt u (of uw naaste) na de proefperiode voortaan de injectie thuis zelf toedienen.

Voortzetten behandeling

Na de proefperiode heeft u een afspraak met de longarts of verpleegkundig specialist om te bespreken of het medicijn helpt. Dan wordt in overleg besloten of u met de behandeling doorgaat of niet.

Als de behandeling met dupilumab goed effect heeft, gaat u het medicijn voor lange tijd gebruiken. Vanaf dan kunt u thuis zelf de injectie dupilumab toedienen. Dat doet u dan iedere 2 weken.

Zelf injecteren niet verplicht

Het zelf injecteren is overigens niet verplicht. Lukt het zelf injecteren niet, dan kan het Thuisbeter team u daarin ondersteunen. Zij komen u dan aan huis prikken.

Controles

Als u doorgaat met de behandeling, komt u elke 6 maanden bij de verpleegkundig specialist of longarts voor controle.

Minimaal één keer per jaar krijgt u een afspraak bij de longarts. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met uw longarts.

Thuis injecteren: aandachtspunten

Injectiepenen en coolpack in de koelkast bewaren

Uw longarts of verpleegkundig specialist zorgt voor uw recepten. U kunt de injectiepenen afhalen bij de Poliklinische Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt per keer 4–6 penen mee. Belangrijk is dat u thuis de injectiepenen in de koelkast bewaart. Let op dat u de penen niet achterin de koelkast legt: de injectie mag niet bevriezen.

Bewaar ook het coolpack uit het starterspakket in de koelkast.

Wanneer u de injectiepenen ophaalt bij de apotheek, moet u deze in het coolpack naar huis vervoeren.

Vergeet niet het coolpack mee te nemen wanneer u de medicijnen gaat ophalen.

Tip

Een ½ uur voordat u de injectie toedient, kunt u de pen uit de koelkast nemen om deze op kamertemperatuur te laten komen. Dan voelt de vloeistof bij het inspuiten niet koud aan.

Volgt u ook thuis bij het injecteren de stappen op de instructiekaart.

Moment van toedienen

Dien de injectie toe op een doordeweekse dag in de ochtend! Als dat nodig zou zijn, is het namelijk op werkdagen gemakkelijker om voor overleg naar de polikliniek Longgeneeskunde te bellen.

Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Tot slot' aan het einde van de folder.

Vakantie

Houd er met uw planning rekening mee dat u de injectie niet tijdens uw vakantie mag toedienen.

Neem steeds weer deze vragen door

Voordat u de injectie met dupilumab toedient, moet u elke keer weer eerst onderstaande vragen doornemen:

- Heb ik de afgelopen week een vaccinatie gehad?
- Heb ik de afgelopen week koorts gehad?
- Heb ik de afgelopen week last van diarree en braken gehad?
- Heb ik de afgelopen week mijn huisarts bezocht? Zo ja, waarom.
- Zijn mijn benauwdheidsklachten afgelopen week sterk verergerd?
- Heb ik na de vorige injectie klachten gehad? Zo ja, welke klachten en hoe erg waren ze?

Als u een van deze vragen met ja beantwoordt, bel dan eerst voor overleg naar de polikliniek Longgeneeskunde. Dan hoort u of u de injectie die dag mag toedienen.

Voor vrouwen: wilt u zwanger worden of bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dat altijd door aan de verpleegkundig specialist.

Herken ernstige allergische reacties

Het is goed om te weten wat de voortekenen kunnen zijn van een ernstige allergische reactie. Wanneer u *één* van de volgende symptomen krijgt, dan is dat meestal een milde allergische reactie.

Krijgt u *meerdere* ernstige klachten van de volgende symptomen, **bel dan direct:**

- Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Longgeneeskunde, tel. (078) 652 33 28. Ook als u twijfelt, belt u.
- Heeft u dringend hulp nodig buiten deze tijden? Bel dan naar afdeling C1, tel. (078) 652 34 54.

Symptomen van de huid

- Jeuk.
- Roodheid van de huid.
- Galbulten.
- Zwelling.

Symptomen van de luchtwegen

- Jeuk/zwelling van de lippen, tong of keel.
- Moeite met slikken.
- Moeite met ademen.

- Kortademigheid.
- Druk op de borst.
- Piepende ademhaling.

Andere symptomen

- Misselijkheid.
- Duizeligheid.
- Flauwvallen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Longgeneeskunde. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur, tel. (078) 652 33 28.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 1577