

Rituximab

Voorgeschreven door de internist-
nefroloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

De internist-nefroloog heeft met u besproken dat u het medicijn Rituximab gaat gebruiken. In deze folder leest u meer over de behandeling met Rituximab.

Het is belangrijk dat u deze folder goed leest. Als u nog vragen heeft kunt u deze altijd met uw internist-nefroloog bespreken.

Werking van Rituximab

Rituximab is een medicijn dat het afweersysteem beïnvloedt. Het wordt onder andere gebruikt bij auto-immuunziekte (waarbij het lichaam zichzelf aanvalt) zoals een vasculitis, IgG4-gerelateerde ziekte of retroperitoneale fibrose.

Rituximab werkt door specifieke afweercellen (B-cellen) te verminderen. Hierdoor kunnen klachten afnemen.

Het gebruik van Rituximab

Rituximab wordt via een infuus gegeven op de Dagbehandeling. De internist-nefroloog heeft afgesproken welke hoeveelheid u krijgt.

- U krijgt meestal 500 of 1000mg Rituximab. Soms wordt het medicijn na 2 weken of na 6 maanden opnieuw gegeven.
- De eerste behandeling duurt een hele dag. De toediening van Rituximab zelf duurt ongeveer 4-5 uur en gaat via een opbouwschema.
- Als u Rituximab goed verdraagt, gaat een volgende toediening sneller.

Bijwerkingen

- Rituximab kan een allergische reactie veroorzaken. U krijgt daarom vaak medicijnen voorafgaand aan het infuus. Als u de medicijnen al thuis moet innemen, stuurt uw arts een recept naar de apotheek. Op de verpakking van de medicijnen staat wanneer u ze moet innemen. Het kan ook zijn, dat u de medicijnen via het infuus op de Dagbehandeling krijgt.
- Voor, tijdens en na toediening wordt uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gecontroleerd
- U kunt griepachtige verschijnselen krijgen. U mag thuis paracetamol innemen, om deze klachten tegen te gaan
- Rituximab verlaagt uw eigen afweer. U bent in het half jaar na het infuus daarom vatbaarder voor ontstekingen zoals een longontsteking of gordelroos en ontstekingen kunnen heviger verlopen.

Controle

Vooraf en tijdens de behandeling met Rituximab nemen we regelmatig bloed bij u af. Als daar bijzonderheden uit komen, bespreekt uw arts die met u

Voorzorgen

- Sla op de ochtend van uw afspraak uw medicijnen tegen hoge bloeddruk één keer over.
- Als u koorts heeft, wordt de Rituximab soms niet gegeven. Bent u kort voor de afspraak op de Dagbehandeling ziek of heeft u koorts, bel dan naar de polikliniek Nefrologie.
- Er is geen bezwaar tegen het gebruik van (matig) alcohol tijdens gebruik van Rituximab.

Vaccinaties

- Door de Rituximab bent u gevoeliger voor het krijgen van ontstekingen. Wij adviseren u daarom om vaccinaties waarvoor u een oproep van de huisarts krijgt (bijvoorbeeld griep prik), te nemen.
- Als er tijd is te wachten met Rituximab, is het soms mogelijk een vaccinatie voor gordelroos te krijgen. Bespreek dit met uw arts.
- Heeft u een (reis)vaccinatie nodig? Bij gebruik van Rituximab wordt gebruik van een levend vaccin, zoals het BMR-, polio-, of gele koortsvaccin, afgeraden.

Gebruik Rituximab met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek dat u Rituximab gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over medicijnen vindt u op de websites van het Zorginstituut Nederland, www.zorginstituutnederland.nl/ en op www.apotheek.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Nefrologie, tel. (078) 654 1061. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2196