

Verwijderen van een stukje weefsel uit de mond-, keel- of neusholte

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft een afspraak voor het verwijderen van een stukje weefsel uit de mond-, keel-, of neusholte. In deze folder leest u hier meer over.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is met u besproken of het nodig is dat u deze medicijnen tijdelijk moet stoppen.

Als dit niet met u besproken is of als u twijfelt of de medicijnen die u gebruikt bloedverdunnend zijn, kunt u bellen met de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.

Een aantal voorbeelden van bloedverdunnende medicijnen:

Sintrommitis, Marcoumar, Plavix, Acenocoumarol, Ascal, Acetylsalicylzuur, Aspirine.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer. U zit daarbij op een behandelstoel.

De plaats waar het weefsel verwijderd moet worden, wordt verdoofd met een injectie, watje of spray. Daarna verwijdert de KNO-arts het stukje weefsel uit uw mond, keel of neus. Dit duurt meestal niet langer dan een paar minuten.

Meestal hoeft het wondje niet gehecht te worden. Soms kan het voorkomen dat hechten wel nodig is. Het hechtmateriaal is oplosbaar en hoeft niet verwijderd te worden.

Weefselonderzoek

Het weefsel dat wordt weggenomen, wordt altijd opgestuurd naar het laboratorium voor weefselonderzoek. De uitslag van dit onderzoek is na ongeveer een week bekend bij uw KNO-arts. Deze zal bij een volgende afspraak op de polikliniek de uitslag met u bespreken.

Na de behandeling

U kunt direct na de behandeling weer naar huis. Voor u vertrekt maakt de assistent een afspraak met u voor een controle bij de KNO-arts.

Het wondje kan na de behandeling nog een beetje nabloeden. Dit stopt vanzelf na korte tijd, meestal al na een paar minuten.

Wij adviseren u het eerste uur na de behandeling niets te eten of te drinken. Dit om verslikken te voorkomen. De verdoving is na een uur uitgewerkt. Warme dranken en warm eten kunt u de eerste dag beter even laten afkoelen om nabloeden te voorkomen.

Als het wondje wat pijnlijk is kunt u hiervoor een pijnstiller gebruiken, zoals Paracetamol. Ook het eten van een (water)ijsje helpt goed bij pijn in de mond en keel.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dan zo spoedig mogelijk bellen naar de polikliniek KNO? De vrijgekomen plaats kan dan door een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2022
pavo 0503