

Toedienen van een slaapmiddel bij een zeer pijnlijke ingreep

Bij kinderen op de afdeling
Spoedeisende Hulp

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw kind is op de Spoedeisende Hulp en moet een vervelende en/of pijnlijke ingreep ondergaan. Om dit ongemak voor uw kind zo klein mogelijk te maken is in overleg met u besloten om een medicijn te geven zodat uw kind even 'slaapt'. Tijdens deze periode kan de arts de ingreep uitvoeren met minimaal ongemak voor uw kind.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder kind dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Hoe werkt het?

Uw kind komt door het medicijn in een toestand, waarbij de hersenen zichzelf als het ware afsluiten voor de buitenwereld. Uw kind zal zelf ademhalen, maar zal niet merken dat de arts met hem bezig is. Ook kan hij niet horen wat u tegen hem zegt. Uw kind voelt in deze periode ook geen pijn.

De ogen blijven soms open, maar uw kind kan dan niets zien. Soms zijn er spontane bewegingen van het hoofd of lichaam. Heel soms zijn er kortdurende trekjes van een arm of been. Dit is niet ernstig en gaat vanzelf voorbij als het medicijn uitgewerkt is.

Uw kind kan ook meer dan normaal gaan kwijlen. Soms zoveel dat wij het met een buisje uit de mond zuigen. Ook hiervan merkt uw kind niets.

Na het ontwaken (en ook tijdens het slapen) gaan waarschijnlijk de ogen draaien en kan uw kind dubbel gaan zien. Dit kan voor sommige kinderen beangstigend zijn. Dit is helemaal normaal en gaat vanzelf voorbij.

Naar huis

Tot twee uur na het geven van het medicijn kan uw kind nog misselijk zijn en zelfs overgeven. Dit kan ook nog voorkomen als u alweer thuis bent. Het kan ook voorkomen als uw kind gegeten heeft vóór of na geven van het slaapmiddel.

Mocht uw kind toch honger krijgen in deze periode, dan is het verstandig om een klein beetje eten en/of drinken te geven.

De misselijkheid en het overgeven is geen teken dat er iets ergs aan de hand is. Het gaat altijd vanzelf voorbij.

Een arts waarschuwen

Als u uw kind last krijgt van aanhoudende misselijkheid en/of braken, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp. De afdeling is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10. We beantwoorden uw vragen graag.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:

www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2019
pavo 1264