

# Midline katheter

Ingebracht op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een plaatsing van een zogeheten Midline katheter in de arm. In deze folder leest u hier meer over.

## Wat is een Midline katheter?

U moet voor een periode van maximaal 4 weken behandeld worden met antibiotica die via een infuus gegeven wordt. Om te voorkomen dat u regelmatig geprikt moet worden, wordt er een Midline katheter bij u geplaatst.

Een Midline katheter is een lange infuuskatheter die in een grote ader van de bovenarm wordt ingebracht. Deze katheter is ongeveer 20 centimeter lang.

Als u langer dan vier weken antibiotica via het infuus nodig heeft en/of nog andere medicijnen via een infuus nodig heeft kan er geen Midline katheter worden geplaatst. Er zal dan een PICC-lijn worden geplaatst. Hiervoor is een aparte folder beschikbaar.

## Vorbereiding

- U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.
- Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt kan het zijn dat u in overleg met uw specialist enkele dagen voorafgaand aan de behandeling hiermee moet stoppen.
- Alle overige medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen.
- Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek een hemd zonder ritsen of knopen te dragen.

- Na de behandeling mag u zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u na de behandeling komt ophalen.

### **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## **Inbrengen van de Midline katheter**

De laborant vraagt u om uw armen bloot te maken.

In de echokamer ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De radioloog kijkt vervolgens met een echoapparaat naar een geschikte plaats in de arm om de katheter te plaatsen. Meestal is dit vlak boven uw elleboogsplooi.

Met alcohol wordt uw arm ontsmet, waardoor de arm steriel is. U mag uw arm niet meer aanraken.

Met een naald wordt het bloedvat aangeprikt. Via deze naald wordt een draad opgeschoven in het bloedvat. Vervolgens wordt de Midline katheter daar overheen geschoven. De naald en de draad worden weer verwijderd. Met het echoapparaat wordt gecontroleerd of de katheter op de juiste plaats ligt. De katheter wordt op uw huid vastgemaakt met een speciale pleister. Daaroverheen wordt een zogeheten Tegaderm infuuspleister geplakt ter bescherming van de katheter.

## **Naar huis**

Na de behandeling gaat u nog een ½ uur in de wachtkamer zitten. Hierna wordt de katheter gecontroleerd. Als alles goed gaat mag u daarna naar huis. Tot de volgende dag mag u geen voertuig besturen. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.

## **Verzorging van de katheter**

De verzorging van de katheter vindt in het ziekenhuis of thuis plaats. In het ziekenhuis wordt verzorging gecombineerd met een andere afspraak die u in het ziekenhuis heeft. Als u geen afspraken in het ziekenhuis heeft, wordt de katheter thuis verzorgd door een verpleegkundige van ons ziekenhuis (ThuisBeterTeam). Dit wordt geregeld door uw aanvragend arts.

De katheter moet één keer per week doorgespoten worden. Ook wordt de Tegaderm die erop geplakt zit één keer per week vervangen. Als de Tegaderm loslaat moet de verpleegkundige deze vervangen. Als uw katheter door het ThuisBeterTeam verzorgd wordt, belt u het ThuisBeterTeam.

## **Aandachtspunten**

U mag douchen met deze katheter. Daarbij laat u de Tegaderm zitten. Voor het douchen doet u een stuk vershoudfolie om de katheter heen. Zo houdt u het infuus zo droog mogelijk. Na het douchen verwijdt u de folie weer. U mag niet zwemmen of in bad. .

Als u bloed moet laten prikken, mag dat **niet** in de arm waar de katheter in zit. Er mag wel bloed via de katheter afgenomen worden.

Ook uw bloeddruk mag **niet** gemeten worden aan de arm waar de katheter in zit.

Als de verpleegkundige medicijnen inspuit via de katheter en dit is pijnlijk of u hoort geruis in uw oor, dan zegt u dit meteen.

Als u last krijgt van de volgende symptomen zegt u dit meteen tegen de verpleegkundige of het ThuisBeterTeam:

- Een mogelijke infectie rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus).
- Of als de katheter beschadigd is.
- Of het afsluitdopje is losgeraakt.
- Als uw arm/schouder dik wordt.
- Kortademigheid of pijn in uw longen.
- Temperatuur boven 38,5°C.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of wilt u de tijd van het onderzoek verzetten? Bel dan gerust naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder? [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
oktober 2022  
pavo 1751